

3. Afnemer en ondersteuner NA

Persoonlijke hygiënemaatregelen

- Steek lang haar op of draag het bijeengebonden.
- Houd baarden en snorren kort en schoon.
- Draag geen hand- en polssieraden of lange kettingen.
- Draag geen lange oorbellen.
- Draag geen braces aan handen en/of onderarmen.
- Nagels zijn kort geknipt en schoon.
- Draag geen nagellak en of kunstnagels.
- Dek wondjes af met waterafstotende pleisters

- Laat je persoonlijke spullen in de omkleed/pauzeruimte

Aankleedprocedure

In de pauzeruimte

1. **Ondersteuner NA** en **afnemer** desinfecteren de handen
2. **Afnemer** trekt schort met lange mouwen aan. Zo nodig helpt ondersteuner NA met aankleden (achterzijde goed dicht?)
3. **Afnemer** zet **FFP1 (of FFP2) mondneusmasker** op, **ondersteuner NA** zet **chirurgisch mondneusmasker** op (let op: onderkant onder de kin, bovenkant over de neus, duw neusklem goed aan!).
Zorg ervoor dat het masker overal goed aansluit
4. **Afnemer** zet spatbril op
5. **Afnemer** zet desgewenst muts/haarnetje op
6. **Afnemer** trekt handschoenen aan (handschoen over manchet)

Vorbereiding

In de bemonstertent

1. Zet 3 tafels klaar om de spullen op te leggen (1 voor afnemer, 2 voor materialen, 3 voor ondersteuner NA), als deze nog niet klaar staat.
2. Contact met de patiënt is op afstand. Alleen de **afnemer** komt binnen de 1,5 meter cirkel.
3. Materialen samen klaarleggen:
 1. Container tussen tafels inzetten
 2. Leg een wegwerptafellaken of een onderlegger op de tafels en klem vast
 3. **Ondersteuner NA zet een rekje klaar op tafel 2 met schone buisjes waarop een etiket met barcode is geplakt.**
 4. Zet flacon handdesinfectans, doos handschoenen, op tafel afnemer (zie afbeelding 1)
 5. Ondersteuner NA zet op tafel 2 de box met voorraad materialen, fles alcohol 80%/70%, gaasjes, pen, rekje met gestickerde buisjes vloeistof, en maakt 2 bekkens klaar met 1 keelwat, **1 neuswat**, 1 buisje vloeistof, 1 tongspatel en 1 tissue (zie afbeelding 2)
 6. Afnemer pakt voor elke nieuwe afname met schone handen een gevuld **bekken** van de tafel
 7. Zet (oranje) lab koffer op de grond met daarin een geopende grote safetybag



Afbeelding 1: tafel afnemer

Afbeelding 2: Tafel assistent

Werkwijze monsterafname

1. **Ondersteuner NA** blijft buiten 1,5 m zone
2. **Patiënt komt aanrijden**. **Ondersteuner NA controleert naam patiënt**
3. Laat de persoon in de auto zitten en vraag hem/haar de auto op de handrem te zetten(!), de motor uit te zetten, en benen buiten de auto te draaien, terwijl hij /zij blijft zitten in de auto. Laat wel wat naar voren schuiven op de rand van de stoel. Óf laat de persoon plaatsnemen op de achterbank aan de kant van de bemonsteraar.
4. **Afnemer** vertelt patiënt kort wat er gaat gebeuren
5. **Afnemer** neemt **eerst de keelwat af en vervolgens de neuswat**

Werkwijze keelwat

- Maak de verpakking van de keelwat open
- Pak een buisje met etiket, draai het open, zet het buisje in het rekje en leg dopje ernaast
- Laat patiënt het hoofd achterover buigen
- Gebruik eventueel spatel om tong naar beneden te duwen
- **Strijk wattenstok langs achterwand van de keel** (dit geeft kokhalseffect)
- Plaats de wat in het virustransportmedium (het buisje)
- Knip/breek de wattenstok af en laat het buisje open voor neuswat
- Gooi afval weg in vuilniszak (tongspatel, verpakkingen)

Werkwijze neuswat **alleen uitvoeren indien de specifieke nasofarynx wat aanwezig is, dus niet met een keelwat een neusweek afnemen.**

- Geef de patiënt een tissue en laat patiënt neus snuiten
- Maak de verpakking van de neuswat open
- Laat patiënt hoofd achterover buigen
- Trek de neuspunt iets omhoog
- Schuif de wattenstok voorzichtig door een neusgat zo diep mogelijk in de neus tot een lichte weerstand wordt gevoeld (ongeveer 3/4 van het stokje gaat neus in)
- roteer de wattenstok enkele malen rond in het neusgat tegen de achterwand (nasofarynx)
- Trek de wattenstok langzaam terug
- Plaats deze wat ook in het buisje vloeistof (medium)
- Knip/breek de wattenstok af en draai buisje goed dicht
- **Scan de barcode van het buisje**
- **Zet het buisje in het daarvoor bedoelde rekje in de koffer, waarin een safetybag is geplaatst**

Opruimen werkplek na elk getest persoon (afnemer)

- Bekken kan blijven staan. Onderlegger kan blijven liggen. Gooi na 1 dagdeel weg.
- Gooi overige gebruikte, vieze materialen weg
- Trek de handschoenen uit en gooi weg in de vuilnisbak
- Desinfecteer de handen.
- Trek schone handschoenen aan voor de volgende test
- Afnemer pakt met schone handen van de 2e tafel een bekken met nieuw afnamemateriaal

5. Ondersteuner NA (bemonstering)

Materialen

- Laptop met internetverbinding (op locatie aanwezig)
- Scanner
- Login voor CoronIT (indien medewerker van GGD West-Brabant)
- Evt. Mond-neus masker (GEEN handschoenen)
- Fles handdesinfectans

8.00-9.00 uur: Voorbereiden

- Etiketten met streepjescode in de lengterichting plakken op de labbuisjes met schone, gedesinfecteerde handen. De labbuisjes plaatsen in een rekje. Het rekje plaatsen op de tafel van de assistent.
- Laptop reinigen:
 - Afnemen met vochtige, wegwerp allesreinigerdoekjes.
 - Aan het begin van de dienst
 - Voor terugplaatsing in/aan oplader
 - Voor overdracht aan collega
- Laptop met scanner klaarzetten in de tweede tent van de straat, op de tafel van de assistent (tafel 2) (schoon gedeelte)
- Inloggen in CoronIT. Bedien de laptop met schone handen, dus nadat je de handen hebt gedesinfecteerd.
- Geel hesje met GGD-logo aantrekken.
- Mondmasker opzetten.
- Fles handdesinfectans op tafel zetten
- Zet op de tafel naast de afnemer een rekje met buisjes klaar waarop je etiket met barcode hebt geplakt
- Maak 2 bekkens klaar met 1 neuswat, keelwat, tongspatel, buisje vloeistof en tissue voor de afnemer
- Vul na elke afname een nieuw bekken voor de afnemer
- Desinfecteer je handen na circa 10 cliënten met handalcohol

