

To: [redacted] 5.1.2e @vrgz.nl | [redacted] 5.1.2e @vrgz.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 7/7/2020 12:57:49 PM
Subject: gebruik pbm
Received: Tue 7/7/2020 12:57:49 PM

Beste [redacted] 5.1.2e,

Hierbij een reactie op je vragen mbt juiste omgang pbm *bij lichamenlijk onderzoek*:

Uitgaande van verschillende situaties:

1. Cliënt met geen verdenking/ besmetting covid> de gebruikelijke persoonlijke hygiëne dus met handschoenen, 'dokers'-laboratoriumjas met korte mouwen (zodat handhygiëne goed kan worden uitgevoerd), soms, afhankelijk van het soort onderzoek hierbij halterschort bij mogelijk contact met lichaamsvloeistoffen.
2. Cliënt met verdenking covid/ besmetting covid bij < 1,5m afstand handschoenen, schort lange mouwen en chirurgisch mondneusmasker.
3. Als je zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt, met name als er kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk gaan uitlokken zoals een keelwreek, ook dan is een chirurgisch masker en oogbescherming nodig ongeacht er wel of niet sprake is van een bekende besmetting/ infectie met covid.

Verder worden handschoenen nooit ontsmet, dit geeft risico op beschadiging/aantasting van de handschoenen en ontstaan van pinholes, microscopisch kleine gaatjes waardoor handschoenen doorlaatbaar worden voor (bloed overdraagbare) micro-organismen. Gewoon handschoenen na gebruik uittrekken en toepassen handhygiëne.

met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

@rivm.nl | info@lchv.nl | www.lchv.nl

N.b. Let op: bovenstaand advies is verstrekt als antwoord op een specifieke vraag en is daarom niet geldig in andere omstandigheden c.q. een andere setting.