

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Thur 10/15/2020 12:38:58 PM  
**Subject:** RE: persoonlijke beschermende middelen in de eerste lijn.  
**Received:** Thur 10/15/2020 12:38:58 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

Naar aanleiding van het advies over PBM gebruik in de zorg (78° OMT), wordt de LCI richtlijn voor PBM gebruik buiten het ziekenhuis aangepast. Hierover is contact met o.a. de V&VN en de FMS.

Dit betekent dat het advies wordt om een chirurgisch mondneusmasker te gebruiken als

- Als er contact is <1,5 meter gedurende meer dan 15 minuten
- Als de verwachting is dat er meerdere direct op elkaar volgende contacten zijn, waarbij de medewerker geen 1,5 meter afstand kan houden

De reden dat dit aangepast is/wordt is je bekend: de kans dat iemand presymptomatisch is wordt groter nu er veel COVID-19 voorkomt.

Bovenstaande geldt voor situaties waarbij wél goede triage mogelijk is, de client geen klachten heeft en niet positief getest is voor COVID-19. Als iemand wel klachten heeft of positief getest is, of als er geen tijd is voor triage (spoedzorg), zal er meer PBM nodig zijn, dus ook een bril/schort/handschoenen.

Voor het BCO geldt dat de richtlijn iets zal worden aangepast: zorgmedewerkers die een medisch mondneusmasker hebben gedragen tijdens het contact met een (pre symptomatische) COVID-19 patient worden dan beschouwd als een cat 3 (overig, niet nauw) contact. Ze worden dan wel gewaarschuwd, maar mogen doorwerken.

In situaties waarbij kort contact is binnen de 1,5 meter, of waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden, is geen mondneusmasker nodig. Dit is ongewijzigd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)

Werkdagen [redacted] 5.1.2e

---

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM )**

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 [redacted] 5.1.2e 3720 BA Bilthoven

[redacted] 5.1.2e

---

Groet, [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e . <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 15 oktober 2020 13:17

**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: persoonlijke beschermende middelen in de eerste lijn.

Hoi [redacted] 5.1.2e

Over deze vraag had ik geappt, ik zou zeggen De richtlijn zegt 2 t m 4 geen pbm en bij 2 heb je dan pech als de mevrouw besmet blijkt.

Volgens mij is de lci richtlijn duidelijk en ik zie niet waar er licht zit tussen wat vws zegt (niks volgens mij, kan hooguit rijksoverheid.nl zijn en die is niet zo specifiek) rn wat het rivm zegt

5.1.2e

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Datum:** donderdag 15 okt. 2020 10:51 AM  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: persoonlijke beschermende middelen in de eerste lijn.

Hai 5.1.2e

Wederom een vraag vanuit de geboortezorg partijen, die doorgaat op de eerder geconstateerde onduidelijkheid., zie onderstaand en bijlage.

In het LCI richtlijn testbeleid bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis staat:  
*NB. Zorgmedewerkers die persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hebben gebruikt tijdens de verzorging van een patiënt met COVID-19, worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek. Zie voor de definities en meer informatie het [Protocol Bron-en contactonderzoek](#).*

In het LCI protocol BCO staat:  
*\*\* Zorgmedewerkers die persoonsbeschermende maatregelen hebben gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen voor hun beroepsgroep worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.*

Eerder heb ik richting hen aangegeven dat het gaat om volledig PBM, mondkapje, bril, handschoenen en schort. Nu wordt er verwezen naar de richtlijnen eigen beroepsgroep.

Het lijkt alsof ze niet uit hu eigen richtlijnen komen, gezien hun vragen onderaan in hun mail.

Het LCI heeft uitgangspunten voor PBM buiten het ziekenhuis gepubliceerd: <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>  
 Deze uitgangspunten zijn niet geactualiseerd sinds de laatste OMT adviezen over preventief gebruik van PBM door zorgmedewerkers.

Wat is handig om te doen? Is het gebruikelijk dat ik ze verwijst naar LCI voor hun vragen? Of zal ik ze adviseren aan de hand van de OMT adviezen, de PBM richtlijn van de FMS en de V&VN hun eigen richtlijn te herzien?  
[https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov\\_downloads/3387/file/11082020\\_Flowchart\\_PBM\\_gebruik.pdf](https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3387/file/11082020_Flowchart_PBM_gebruik.pdf)

Groet,  
 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>  
**Verzonden:** woensdag 14 oktober 2020 14:53  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@knov.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@bogeboortezorg.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@collegepz.nl>  
**Onderwerp:** persoonlijke beschermende middelen in de eerste lijn.

Beste 5.1.2e

Namens de geboortezorgpartijen in de eerste lijn zouden wij heel graag een eenduidige lijn t.a.v. persoonlijke beschermende middelen willen communiceren.

Geboortezorgmedewerkers in de eerste lijn ervaren nu onrust en onduidelijkheid over wélk soort persoonlijke beschermende middelen nu precies in welke situatie gedragen moet worden.

We willen voor onze geboortezorgprofessionals uiteraard de kans op besmetting zo gering mogelijk houden. Daarnaast is het belangrijk om – met het oog op capaciteitsproblematiek - onnodige quarantaine te minimaliseren.

Daarvoor is het belangrijk dat we heel exact weten wanneer de GGD een zorgmedewerker gaat meenemen in het bron- en contactonderzoek. Nu ervaren we dat de verschillende GGD's andere interpretaties hanteren van de PBM-voorschriften.

Op de website <https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid> zien we het volgende:

*Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan [= onderzoek en quarantaine sva] afgeweken worden, mits de zorgmedewerker geen klachten heeft en tijdens het werk **altijd** een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II draagt. Daarnaast draagt de zorgmedewerker ook nog handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.*

Eerstelijns zorgverleners ervaren echter dat regionale GGD's andere richtlijnen hanteren.

Daarom:

Zouden jullie een uitspraak over de volgende 4 scenario's kunnen doen? Of eigenlijk voor de laatste 3 scenario's? Het eerste scenario is uiteraard duidelijk.

Welk sóórt PBM is precies nodig?

- 1) Client met verdenking op Covid 19 besmetting of met een positieve test: zorgverlener verleent zorg in volledig PBM = in elk geval: minimaal mondneusmasker type IIR, spatbril, schort en handschoenen

Scenario's, allemaal bij NIET Covid 19 cliënten ZONDER klachten, welke PBM?

- 2) Zorgverlening binnen 1,5 meter, langer dan 15 min (bijv bij SEO, Durante Partu, ondersteuning bij BV)
- 3) Zorgverlening binnen 1,5 meter, korter dan 15 min (bij bij Uitwendig Onderzoek, bloeddruk meten)
- 4) Zorgverlening op 1,5 meter of meer, korter dan 15 min (bijv bij spreekuur)

Deze vragen zijn eerder door KNOV gesteld. We begrijpen dat er ruimte zit tussen het advies van RIVM en het advies van VWS.

We hopen dat het mogelijk is om een eenduidig advies af te geven en hopen dat de GGD dan ook dit advies overneemt.

Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



College Perinatale Zorg  
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

5.1.2e

E: 5.1.2e @collegepz.nl  
[www.kennisnetgeboortezorg.nl](http://www.kennisnetgeboortezorg.nl)

**Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin**

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Facebook](#) en/of meld je aan voor onze [nieuwsbrief](#).