

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 2/2/2021 9:54:54 AM
Subject: RE: mnm in de zorg zonder bewijs/concreet vermoeden COCID-19
Received: Tue 2/2/2021 9:54:55 AM

Hoi [redacted] 5.1.2e

Dit klopt. Voor contact met patiënten/cliënten die geen klachten hebben geldt uiteraard ook dat FFP2 maskers niet nodig zijn.

Samengevat:

- chirurgische maskers volstaan, FFP2 is niet nodig
- in loop van de week worden alle relevante rivm adviezen en documenten aangepast
- wat verandert is dat er ook preventief gebruik (bij personen zonder klachten) van PBM wordt geadviseerd als het contact binnen de 1,5 meter **korter is dan 15 minuten**
- voor contact met kinderen tot en met 12 jaar die geen klachten hebben passend bij covid, is PBM gebruik niet nodig (basishygiene is voldoende)

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 10:38
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: mnm in de zorg zonder bewijs/concreet vermoeden COCID-19

Beste [redacted] 5.1.2e

Toch nog even een vraagje: dit staat er in het OMT advies (97, deel 2):

'Kortom, op basis van de wetenschappelijke inzichten op het gebied van infectiepreventie volstaat een chirurgisch mondneusmasker IIR in de zorg voor personen met (vermoeden van) COVID-19, zolang er geen aerosolvormende handelingen worden uitgevoerd'.

Maar in de (preventieve zoals hielprik/bev onderzoek) zorg zonder concrete aanwijzing covid-19 wordt toch ook chir mnm geadviseerd? Wanneer dus op korte afstand (ook wanneer minder dan 15 min)? Dat zou in een ziekenhuis dan toch ook gelden?

Dan zou geel gearceerde stuk er eigenlijk uit moeten?

Of zie ik het verkeerd?

Groet, dank,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
T 030 - [redacted] 5.1.2e
www.rivm.nl/infectieziekten