

To: 5.1.2e [redacted]@lumc.nl; 5.1.2e [redacted]@lumc.nl; 5.1.2e [redacted]@gmail.com; 5.1.2e [redacted]@gmail.com]
Cc: 5.1.2e [redacted]; 5.1.2e [redacted]@rivm.nl]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Mon 11/9/2020 2:47:53 PM
Subject: aanpassing OMT advies mondmaskers nodig?
Received: Mon 11/9/2020 2:47:53 PM

Beste 5.1.2e [redacted]

Naar aanleiding van het OMT advies over preventief gebruik van mondneusmaskers hebben we de Uitgangspunten PBM gebruik bij verzorging, verpleging en medische handelingen buiten het ziekenhuis herzien.

Conform het OMT advies en de FMS Leidraad adviseren we preventief gebruik van een chirurgisch mondmasker tenminste type II bij contacten van >15 minuten op < dan 1,5 meter, zie <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>

Voor verpleeghuizen en wijkverpleging wordt – met het oog op de kwetsbaarheid van de doelgroep- altijd preventief mondneusmaskergebruik geadviseerd.

Inmiddels gebruiken de huisartsen ook bij alle spreekuurcontacten binnen 1,5 meter preventief een mondneusmasker.

En we krijgen signalen dat dat ook in veel ziekenhuizen gebeurt.

Daarom vragen we ons af of we het OMT-advies niet moeten herzien.

Zeker bij personen uit risicogroepen (met name ouderen) willen we eigenlijk bij alle zorgcontacten binnen 1,5 meter preventief mondneusmaskergebruik adviseren.

Hoe staan jullie daar in?

Ik begreep dat het FMS advies mogelijk ook aangepast gaat worden?

Graag overleg.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]

Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)

Postbus 1 5.1.2e [redacted]

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 -

5.1.2e [redacted]

Fax: 030