To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e ([5.1.2e])[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e @minvws.nl[5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Mon 5/3/2021 8:42:28 AM
Subject: Deens onderzoek vaccinatie na COVID infectie
Received: Mon 5/3/2021 8:42:30 AM

Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4million PCR-tested individuals in Denmark in 2020 a population-levelobservational study.pdf

Hoi,

Ter info: Deens onderzoek (n=525.339) heeft het belang bevestigd van vaccinatie, ook nadat iemand een COVID infectie heeft doorgemaakt. Een artikel hierover is gepubliceerd in de Lancet (zie bijlage). Hiervoor vergeleken zij het percentage infecties in de tweede golf tussen positief geteste personen (n = 11.068; 2,11%) en negatief geteste personen uit de eerste golf.

Kernbevindingen:

- Er was gemiddeld 80,5% bescherming tegen herinfectie in de hele populatie: 0,65% positieve SARS-CoV-2-tests in de tweede golf onder mensen met een positieve test in de eerste golf versus 3,27% onder mensen die eerder negatief hadden getest. *Vanaf 65 jaar, de risicogroep voor complicaties, was deze bescherming echter slechts 47,1% (95%-BI 24,7 tot 62,8).*
- Ook mensen die al een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt moeten worden gevaccineerd.
- Vooral bij ouderen is de natuurlijke immuniteit na een eerdere infectie te laag om voldoende te beschermen tegen herinfectie.

Samenvatting artikel in Huisarts&Wetenschap: Nieuws | SpringerLink

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e | 5.1.2e |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Programmadirectie COVID-19|
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
5.1.2e @minvws.nl | *06 5.1.2e | 5.1.2e
www.rijksoverheid.nl |