



Volgorde te vaccineren groepen

Groep I. Gevaccineerd met Biontech/Pfizer of Moderna

Groep II. Eerste groep die wordt gevaccineerd met Astrazeneca

Groep III. Tweede groep die gevaccineerd wordt met Astrazeneca

Patiënten

Groep I (Biontech/Pfizer of Moderna)

1. Patiënten die ouder zijn dan 60 jaar
2. Patiënten van 18 tot 60 met een medische kwetsbaarheid: chronische luchtweg- of l

Groep II(Astrazeneca)

3. Patiënten jonger dan 60 jaar zonder medische indicatie

Medewerkers

Groep I (Biontech/Pfizer of Moderna)

1. De intramurale zorgmedewerkers ouder dan 60 jaar

Groep II(Astrazeneca)

1. De intramuraal werkende zorgmedewerkers en de ambulante crisisdienstmedewerk

Groep III (Astrazeneca)

Levering vaccin

en voor de geprioriteerde vaccinatie GGZ

rensiche instellingen met 24-uurs zorg, TBS-instellingen met 24-uurs zorg, PPC's, BW's m

n beheer te kunnen vaccineren, danwel uit te besteden of in samenwerking met colle

sluitend aan de groepen I en II kan worden gevaccineerd. Voor het geval dat wel zo zal z

onderscheid gemaakt in:

ongproblemen, hartpatiënten, diabetes met complicaties, nierziekte, verminderde wee

die frequent, direct en nabij patiënten contact hebben tijdens hun werk. Daarbij is het h
rs. De medewerkers ondersteunende diensten, facilitaire dienst, administratieve medew

rd:

et Pfizer of Moderna

ers 18-60 jaar

n.

ansluitend mee kan zal deze groep mee gaan met de groep Overige Zorgmedewerkers

Tmedewerkers en andere thuis begeleiding

erkers gelden dat ze direct patiëntcontact hebben waarbij 1,5 meter afstand houden ni

ks dezelfde tijd zullen worden opgeroepen door de eigen huisarts of GGD. Zij hoeven da

voor groep I , II of groep III. Gezien de voorlopige schaarste van vaccins is het belang

en toegediend. Grote instellingen met meerdere locaties moeten bepalen op welke loc

et 24-uurs begeleiding, Opvang met 24-uurs zorg

ga-instellingen. De GGD is hiervan uitgezonderd, die zal geen uitvoerende rol spelen.

ijn is de inventarisatie van belang.

rstand tegen infecties door metabool syndroom of autoimmuunziekte, bloedziekte, kanke

ouden van 1,5 meter afstand vaak niet te garanderen.

erkers en technisch personeel, vrijwilligers en mantelzorgers behoren niet tot deze gep

die bij de GGD zal worden gevaccineerd)

et mogelijk is, dit zou het geval kunnen zijn bij: specifieke poliklinische behandelaars, po
arom niet in deze inventarisatie te worden meegenomen.

rijk dat u deze criteria strak hanteert en niet "oprekt" naar medewerkers die hier niet

aties de vaccinatie zal plaatsvinden. Dit zijn per definitie locaties waar patiënten intram

en worden geleverd. Van de grote instellingen met meerdere vaccinatie locaties wordt g

patiënten met recente chemotherapie, transplantatiepatiënten, leverziekte en zeer ern

rioriteerde groep.

liklinische groepstherapeuten of non-verbale therapeuten, PVP'ers, Geestelijke verzorg

onder vallen.

uraal verblijven. Wanneer de extramurale medewerkers mee kunnen in het vaccinatietr

evraagd deze inventarisaties per locatie, gebundeld voor de hele instelling aan te leveren

stig overgewicht.

ing, medewerkers dagactiviteitencentra, arbeidsrevalidatiecentra etc.

aject dan komen zij naar één van deze locaties.

n.

nl

.nl

