

Landelijk Beeld Beschikbaarheid Geneesmiddelen.



Code Groen. Aantal beschikbare dagen geneesmiddelen voor huidige bezetting is meer dan 14 dagen.

Samengevoegd op ToepassingsCategorie.

Basis is huidige 221 bedden. 1800 bedden direct is een prognose.

| | | 221 bedden | | | | 1800 bedden | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|------------|--|------------------|-----------|--|
| | | voorraad ziekenhuizen | nieuwe voorraad (fabrikanten, groothandel) | Totaal | | additioneel productie & fabrikanten binnen 7 dagen | Totaal | | additioneel productie & fabrikanten binnen 7 dagen |
| Sedatie | Propofol | 119 dagen | 265 dagen | 384 dagen | -25 | 70 dagen | 47 dagen | -3 | 9 dagen |
| | Midazolam | 286 dagen | 641 dagen | 927 dagen | -8 | dagen | 114 dagen | 0 | dagen |
| | Dexmedetomidine | 21 dagen | 77 dagen | 98 dagen | 10 | dagen | 12 dagen | 1 | dagen |
| | Sedatie | 426 dagen | 983 dagen | 1410 dagen | -22 | 70 dagen | 173 dagen | -2 | 9 dagen |
| Pijnbestrijding | Fentanyl | 99 dagen | 263 dagen | 362 dagen | -2 | dagen | 44 dagen | 0 | dagen |
| Pijnbestrijding | Remifentanyl | 23 dagen | 141 dagen | 163 dagen | -12 | dagen | 20 dagen | -1 | dagen |
| Pijnbestrijding | Sufentanyl | 29 dagen | 72 dagen | 101 dagen | 2 | dagen | 12 dagen | 0 | dagen |
| Pijnbestrijding | Morfine | 187 dagen | 4465 dagen | 4652 dagen | 23 | 90 dagen | 571 dagen | 5 | 11 dagen |
| Pijnbestrijding | Esketamine | 20 dagen | 156 dagen | 176 dagen | 8 | dagen | 22 dagen | 1 | dagen |
| Pijnbestrijding | | 357 dagen | 5096 dagen | 5453 dagen | 19 | 90 dagen | 670 dagen | 5 | 11 dagen |
| Spierverslappers | Atracurium | 4 dagen | 8 dagen | 12 dagen | | dagen | 1 dagen | 0 | dagen |
| Spierverslappers | Cisatracurium | 3 dagen | 1 dagen | 4 dagen | | dagen | dagen | 0 | dagen |
| Spierverslappers | Rocuronium | 146 dagen | 238 dagen | 384 dagen | -6 | dagen | 47 dagen | -1 | dagen |
| Spierverslappers | | 153 dagen | 246 dagen | 400 dagen | -6 | dagen | 49 dagen | -1 | dagen |
| Ceftriaxon | Ceftriaxon | 185 dagen | 1392 dagen | 1577 dagen | -8 | dagen | 194 dagen | 0 | dagen |
| Clonidine | Clonidine | 245 dagen | 644 dagen | 890 dagen | -14 | dagen | 109 dagen | -1 | dagen |
| Noradrenaline | Noradrenaline | 1062 dagen | 2247 dagen | 3308 dagen | -17 | dagen | 406 dagen | 0 | dagen |

Algemene Toelichting Tabellen Overzicht

- Overzicht geeft de beschikbaarheid van geneesmiddelen weer over het huidige aantal **beademde patiënten** (van belang voor inzet sedativa). Gecalculiseerd obv Covid en non-Covid ICU patiënten bij wie gemiddeld beademing nodig is.
- Tevens is prognose bijgevoegd in casu bezetting direct (!) van 1800 beademde patiënten op de ICU.
- Overzicht maakt de beschikbaarheid inzichtelijk per geneesmiddel. Dat betreft zowel de beschikbaarheid van gereed product voor direct gebruik ('voorraad ziekenhuizen') als uit voorraad ('nieuwe voorraad (fabrikanten, groothandel)').
- Daarnaast wordt 'additionele productie binnen 7 dagen' apart vermeld. Dat is de verwachte productie door bereidingsapotheken.
- Beschikbaarheid is aangegeven op 2 niveaus.
 - Niveau 1: Geaggregeerd per toepassingscategorie: Sedatie, Pijnbestrijding, Spierverslappers en Overig.
 - Niveau 2: Per middel, gegroepeerd per indicatie.
- Overzicht geeft de beschikbaarheid van geneesmiddelen weer. Het totaal van de middelen per indicatie is maatstaf voor de beschikbaarheid van de geneesmiddelen voor die indicatie.
- Middelen per indicatie zijn onderling uitwisselbaar te gebruiken.
- De beschikbaarheid is aangegeven in patiëntdagen op basis van de beschikbare voorraad van het geneesmiddel en geprognoseerd verbruik.
- De gehanteerde dagdosering per geneesmiddel is gebaseerd op de nu best beschikbare informatie. Deze zal op basis van trendgegevens en verdere uitvraag worden geoptimaliseerd.
- Ceftriaxon (100% vd patiënten; 2 gr/patiënt), Clonidine (25% vd patiënten; 1,44 mg/ patiënt) Noradrenaline (30% vd patiënten; 15 mg/patiënt). Sedatie, Pijnbestrijding (reële dosering op 100% patiënten), Spierverslapping (reële dosering op 30% patiënten).