




# Griep (influenza) en het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?



Verschillen			Overeenkomsten
Influenzavirus	SARS-CoV2	<b>Virus</b>	
	Verlies van reuk en smaak, darmklachten	<b>Klachten</b>	Koorts, hoesten, benauwdheid, keelpijn, loopneus, spierpijn
1-4 dagen na besmetting	2-14 dagen na besmetting	<b>Hoe lang duurt het voor je klachten krijgt?</b>	
Jonge kinderen	Nog niet volledig bekend	<b>Risicogroepen</b>	Onder andere ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen
1 dag voor symptomen tot 7 dagen na start van klachten	2 dagen voor symptomen ten minste 7 dagen na start van de klachten	<b>Besmettelijke periode*</b>	
		<b>Verspreiding</b>	Verspreiding via druppels die bijvoorbeeld verspreid kunnen worden door hoesten/niezen. Eventuele verspreiding via handen en contact met slijmvliezen.
	Bloedpropjes (trombose)	<b>Complicaties</b>	Longontsteking, ademhalingsproblemen, secundaire bacteriële infecties
Jaarlijks griepvaccin	Nog niet beschikbaar	<b>Vaccin</b>	

\* De besmettelijke periode kan soms langer zijn bij een langere ziekte duur of bij immuungecompromiteerden.