

## BELEID BIJ BEPERKTE BESCHIKBAARHEID REMDESIVIR

Op basis van de huidige aantallen COVID-19 patiënten en de beperkte beschikbaarheid van remdesivir zijn tekorten niet uit te sluiten. Om de kans op tekorten te beperken wordt van de medisch specialist verwacht zich strikt aan de indicatiestelling te houden en onderstaand advies te volgen.

### Advies gebruik remdesivir:

Op advies van de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen Plus (ATG+), een commissie met afvaardiging vanuit de NVIC, NVA, NIV/NVII, NVALT, SWAB en NVZA, adviseren wij medisch specialisten met klem bij het initiëren van een behandeling met remdesivir de volgende uitgangspunten te volgen:

- Overweeg alleen een behandeling met remdesivir bij positief geteste COVID-19 patiënten met evidente zuurstofbehoefte op een verpleegafdeling.
- Behandel maximaal 5 dagen.
- Stop remdesivir bij ontslag uit het ziekenhuis of bij opname op de intensive care.
- Starten van remdesivir op de intensive care wordt sterk ontraden (conform advies NVIC), omdat:
  - er onvoldoende bewijs is dat remdesivir een positieve bijdrage heeft op het behandelresultaat bij patiënten die High Flow Nasal Prong therapy (HFNP) of intensieve beademing krijgen;
  - de kans op bijwerkingen en interacties met andere medicatie (via CYP3A4) op de intensive care groter is.
- Starten van remdesivir bij patiënten met HFNP (zoals optiflow) op de verpleegafdeling wordt sterk ontraden.

Er is op basis van de huidig beschikbare literatuur volgens de commissie ATG+ geen verdere medische selectie mogelijk.

### Achtergrond

Het aantal COVID-19 patiënten dat potentieel in aanmerking komt voor een behandeling met remdesivir neemt toe. Ondanks dat de Europese Commissie extra remdesivir heeft ingekocht, is de beschikbaarheid in Nederland op dit moment beperkt. De remdesivir wordt in kleine batches over Europa verdeeld en door het RIVM naar de ziekenhuizen gedistribueerd. Op basis van de stijgende aantallen patiënten zijn tekorten niet uit te sluiten. Het is de verwachting dat de beschikbaarheid in de komende weken zal verbeteren. Het is belangrijk om in geval van schaarste alleen die patiënten te behandelen waar op basis van de beschikbare literatuur aantoonbaar meerwaarde te verwachten is. Wij benadrukken dat alleen door verstandig gebruik en het volgen van bovenstaande adviezen een mogelijk tekort kan worden voorkomen.