To: [redacted] 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e .[5.1.2e @igj.nl]; 5.1.2e .
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @igj.nl]; 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Wed 1/20/2021 9:33:49 AM
Subject: RE: ontheffing ademtest
Received: Wed 1/20/2021 9:33:50 AM

Dag 5.1.2e
Daar sluit ik me bij aan, en ik plak hieronder ook de passage uit het OMT advies 95 die dit ondersteunt.
Groet
5.1.2e

1.2 Toepassing ademtesten in het kader van testen asymptomatische personen

De ademtesttechnologie kan door middel van een ademtest met redelijke gevoeligheid uitsluiten dat er sprake is van een infectie door SARS-CoV-2. Het OMT heeft de testresultaten van de ademtest besproken en komt tot de conclusie dat deze met name een goede sensitiviteit heeft waardoor ze ingezet kan worden als eerste screeningsmethode. Een negatief ademtestresultaat is in 98% van de gevallen ook werkelijk congruent met een negatief testresultaat van de PCR. De ademtest kan daarom als pre-screeningstest ingezet worden bij asymptomatische personen en personen met milde klachten zoals degenen die zich doorgaans presenteren in de teststraten (relatief gezonde en jonge populatie). De combinatie van een ademtest welke indien de uitslag positief of onzeker is opvolging krijgt door een PCR of eventueel antigeensneltest, gaat in AmsterdamNoord verder geanalyseerd worden

Bron: 95e OMT advies | Rapport | Rijksoverheid.nl

[redacted]
5.1.2e @minvws.nl
+31 6 5.1.2e

[redacted]

Dubbel

[redacted]

708218

Dubbel

708218

Dubbel