

### Inputtabel voor richtlijn COVID-19-vaccinatieadvies voor immuungecompromitteerde patiënten

Medische beroepsvereniging: NFN, LONT (landelijk overleg niertransplantatie)

Deskundige(n): 5.1.2e

Datum: 23-12-2020

Aandoening/groep aandoeningen	Type behandeling*	Kan deze patiëntengroep met mRNA vaccin gevaccineerd worden? Ja / nog niet**	Kan tijdens de behandeling gevaccineerd worden? Ja / nog niet / nee	Optimale timing (voor of na behandeling of medicatie)	Opmerkingen
Niertransplantatie patiënten	Pre-transplantatie	Ja	Ja	Idealiter pre-transplantatie, laatste vaccinatie 1 maand pre-transplantatie	
	“Standaard immuunsuppressie” inclusief CNL, proliferatieremmer en steroïden	Ja	Ja	Vanaf 6 weken na niertransplantatie	Conform Influenza
	Inductie- of rejectie behandeling ATG danwel alemtuzumab	Ja	Ja	Vanaf 3 maanden na behandeling met alemtuzumab of ATG	
	Behandeling met rituximab	Ja	Ja	Voor uniformiteit vanaf 3 mnd	Evt 6 mnd of afhankelijk van terugkeer B-cellen

\*Geen informatie op niveau van medicijn maar bij voorkeur in groepen (b.v. remissie-consolidatie, bij biologicals, eerste X maanden na orgaantransplantatie, B-cel depletende medicatie, checkpointinhibitors)

\*\*Nog niet= relatieve contra-indicatie vanwege ziekte/behandeling en/of gezien ontbrekende data in SmPC/trials eerst meer veiligheidsdata nodig zodat vaccinatie later kan volgen met dit vaccin of een ander type vaccin.