

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted]
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted]
Sent: Tue 12/15/2020 2:31:48 PM
Subject: FW: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie
Received: Tue 12/15/2020 2:31:49 PM

Hoi allen,

[redacted] heeft eind nov / begin dec navraag gedaan naar de benodigde termijn tussen de griepvaccinatie en de covid-vaccinatie, aangezien er mogelijk nog in januari griepvaccins worden verspreid. Daarop kreeg zij een antwoord dat er 2 weken tussen vaccinatie moet zitten. Nu ik verifieerde of dit ook voor de pneumokokkenvaccinatie geldt, kreeg ik onderstaande reactie.

In de richtlijn is rond de covid-vaccinatie dus 7 dagen opgenomen, maar hieronder stelt [redacted] dat het op individueel niveau mogelijk anders is. Dus als er al/nog bijwerkingen zijn.

Lijkt me goed om er over na te denken hoe we daar nu in de praktijk van de covid-vaccinatie mee om moeten gaan. Er vanuit gaande dat een griep- of pneumokokkenvaccinatie wel eerder plaatsvindt dan de covid-vaccinatie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek [redacted] | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: [redacted] | **M:** [redacted] | **Kamer** [redacted]
 aanwezig: [redacted]
Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 15 december 2020 15:27
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Dag allen,

In de richtlijn hebben we de volgende tekst opgenomen:
 COVID-19-vaccin wordt in principe niet tegelijk met een ander vaccin toegediend. Er zijn geen gegevens beschikbaar over toediening tegelijk met ander vaccin. Om duidelijk te houden of eventuele klachten bijwerkingen van het COVID-19-vaccin kunnen zijn, wordt geadviseerd om een interval van minimaal 7 dagen aan te houden met andere vaccinaties.

[redacted] en ik hebben net ook nog even met [redacted] overlegd en we houden het op 7 dagen, met de uitleg erbij dus waarom we een interval hanteren. Het gaat er in principe om dat je de bijwerkingen uit elkaar houdt. Dus het zou op individueel nodig kunnen zijn om een langer interval te hanteren.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]
 [redacted]

Mobiel: [redacted]
E-mail: [redacted]@rivm.nl
Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:41
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

5.1.2e

Aangezien jij de vraag opwierp en ik jou ook zie als onze 'linking pin'.
 Kun jij ons uitsluitsel geven wat we nu aan moeten houden in de berichtgeving?
 Twee weken of 7 dagen?
 Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek 5.1.2e | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: 5.1.2e | M: + 5.1.2e | Kamer 5.1.2e

aanwezig: 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 15 december 2020 10:12

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

De bijsluiter zegt er over: over simultaan toedienen zijn geen gegevens. verder niets.
 UK richtlijn: minimaal 7 dagen

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Mobiel: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e@rivm.nl

Werkdagen 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 14 december 2020 17:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Hallo allen,

In concept Richtlijn uitvoering COVID-19-vaccinatie staat het advies van een minimaal interval van 7 dagen.
 Ik cc 5.1.2e en 5.1.2e even mee, want een uniform advies hierover lijkt mij belangrijk.

5.1.2e wat is de achtergrond van 7 dagen? Bijsluitertekst, of UK Richtlijn? Anders?

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 14 december 2020 17:22

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Fijn dank voor de bevestiging 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: 5.1.2e | M: 5.1.2e | Kamer 5.1.2e
aanwezig: 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 14 december 2020 17:22

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Hoi 5.1.2e

Ook voor pneumokokken vaccins zijn er geen gegevens over mogelijke referentie met COVID vaccinatie. Ook hiervoor zou ik een interval van 2 weken aanhouden om bijwerkingen uit elkaar te kunnen houden en beginnen met de pneumokokken vaccinatie.

Groeten,

5.1.2e

