

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Mon 1/4/2021 2:01:32 PM
Subject: RE: Statement on first dose prioritisation
Received: Mon 1/4/2021 2:01:33 PM

Het effect houdt zeker 3 mnd aan, zo lijkt het op basis van de eerste getallen...dat geeft even tijd.. 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: maandag 4 januari 2021 13:28
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: Statement on first dose prioritisation

Dank 5.1.2e voor de info!

Voor zover ik begreep is dit vanochtend ook besproken in de gr/omt vergadering.

Inderdaad zal je snellere waning hebben na 1 dosis in vergelijking met 2 doses, maar doorbaakinfecties zijn wellicht mild.

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: maandag 4 januari 2021 13:03
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: FW: Statement on first dose prioritisation

Hi 5.1.2e

Gelukkig nieuwjaar, al begint het heftig. Dit stuk van de JCVI (zie link in mail 5.1.2e hieronder) is wellicht ten overvloede, maar dacht dat het goed was om te delen.

Dit stuk kreeg ik via 5.1.2e nav onze discussie of je niet liever eerst zoveel mogelijk mensen 1 vaccinatie geeft. Een interval van 3 maanden voor de tweede vaccinatie is op basis van deze documenten prima, mogelijk zelfs beter dan een snellere tweede vaccinatie na 21 dagen (als immunoloog kan ik dat volledig onderschrijven). Wel mag je verwachten dat de boosterrespons goed is voor uiteindelijk langduriger aanhouden van de protectie.

5.1.2a

Tot gauw, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e