

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 12/21/2020 8:33:09 PM  
**Subject:** FW: Wat te doen bij koorts na Covid-vaccinatie?  
**Received:** Mon 12/21/2020 8:33:11 PM  
[Covid-19 vaccinatie - DM 10dec2020 0.pdf](#)

Hoi,

Ik heb nog met [redacted] overleg gehad, want ik dacht dat "alles" in de LCI-richtlijn covid-19 zou komen. Maar we vonden het toch beter om ook iets in de vaccinatierichtlijn op te nemen. We hebben er de volgende tekst van gemaakt:

[redacted]

Bij de verwijzing naar de LCI-richtlijn een link. En in die richtlijn moet ook nog info komen over wat te doen met iemand met koorts en/of andere klachten na vaccinatie. (testen, testen, testen)

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BIG-nummer: [redacted]

Mobiel: [redacted]

E-mail: [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Verzonden:** maandag 21 december 2020 17:47

**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted]

<[redacted]@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: Wat te doen bij koorts na Covid-vaccinatie?

Beste collega's,

Onderstaande mail is in mijn persoonlijke box terecht gekomen afgelopen week.

De opmerking over het % dat koorts krijgt na vaccinatie sluit aan bij wat [redacted] vanmorgen aangaf.

[redacted] staat hier al wat over in de richtlijn? Of [redacted] in de Q&A? Dan kan ik dat als antwoord teruggeven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e MSc,  
5.1.2e  
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@ggdzl.nl>  
**Sent:** donderdag 17 december 2020 12:32  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdzl.nl>  
**Subject:** Wat te doen bij koorts na Covid-vaccinatie?

Beste 5.1.2e

We hebben nog een volgende vraag tav vaccinatie.

Als we kijken naar het % dat koorts ontwikkeld, zeker na de 2<sup>e</sup> inenting (>10%), lijkt het goed als daar beleid op wordt gemaakt.  
Bijvoorbeeld, moet een huishouden van een gevaccineerde thuisblijven als deze binnen x dagen na vaccinatie koorts ontwikkeld (en moet deze persoon getest worden?).

5.1.2e

Groet, 5.1.2e