

Tekst Advies m.b.t. labinf@ct:

Advies betreffende Ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-2019

In het begin van de SARS-CoV 2 uitbraak was nog veel onduidelijk over de transmissieroute en is gekozen voor een FFP2 masker in de patiëntenzorg om ook beschermd te zijn tegen mogelijke aerogene transmissie.

Uitgangspunt voor de maskerkeuze is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid moet bieden bij de verzorging/behandeling van een patiënt met COVID-2019 waarbij de keuze draagbaar en functioneel moet zijn en er niet gekozen moet worden voor onnodige extra veiligheidsmaatregelen.

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS-CoV 2 via druppels en (in)direct contact biedt FFP1 masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-2019.

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals bijv. bronchoscopie, intubatie en handelingen die hoesten induceren. Hiervoor wordt een FFP2 masker geadviseerd.

Aangezien op de intensive care de ernstige zieke patiënten met waarschijnlijk ook een hoge virusload zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht, waarbij de gezondheidsmedewerker direct betrokken is, wordt voor de IC zorg van een patiënt met COVID-2019 om die reden een FFP2 masker geadviseerd.