

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	Ziekenhuismedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Thuisblijven</li><li>• Vervangend werk</li><li>• PBM-gebruik</li><li>• Testen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuele patiëntenzorg</li><li>• Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers</li><li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li></ul>

Buiten het ziekenhuis:			
<b>Huisartsenzorg</b>	Patiënten uit de risicogroep*  Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/ hospice)  <b>Uitwerking door NHG</b>	Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg/ hospice</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>GGD'en</b>	Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding)  Patiënten uit de risicogroep*  Zorgmedewerkers met klachten van andere organisaties buiten het ziekenhuis	GGD-medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestrijdingsmaatregelen zoals contactonderzoek in regio's waar geen wijdverspreide transmissie is</li> <li>• Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis</li> </ul>
<b>Thuiszorg</b>	Niet van toepassing  Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)	Thuiszorgmedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Verpleeghuis</b> (lichamelijk kwetsbare patiënten)	Patiënten verdacht voor COVID-19  Patiënten uit de risicogroep*  <b>conform richtlijn VERENSO</b>	Verpleeghuismedewerker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (isolatie of cohortering)</li> <li>• Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie</li> </ul>

			<p>en medewerkers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Verloskundigen</b>	<p>Niet van toepassing</p> <p>Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis</p>	<p>Verloskundige:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Gehandicaptenzorg</b>  (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	<p>Patiënten verdacht voor COVID-19</p> <p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p><b>conform richtlijn VGN</b></p>	<p>Medewerkers gehandicaptenzorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebeleid (isolatie of cohortering)</li> <li>• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten en medewerkers</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Intramurale GGZ</b>  patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar  mogelijk gedragsproblemen	<p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p><b>conform richtlijn GGZ-NL</b></p>	<p>Mogelijkheden tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul> <p>Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Instellingen voor Jeugdzorg</b> mogelijk	<p>Op indicatie van wie bij gedragsproblemen</p>	<p>Groepswerkers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>

gedragsproblemen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul>	
<b>Ambulancezorg</b>	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis	Ambulancemedewerkers met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>NIVEL-huisartsenpeilstations</b>	Alle patiënten met griepachtige klachten	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance</li> </ul>

\* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

\*\* indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!