

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Fri 3/13/2020 2:06:05 PM
Subject: RE:
Received: Fri 3/13/2020 2:06:00 PM

Mist hier nog iets? Rood is door mij aangepast

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 13 maart 2020 14:32
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject:



Er is **momenteel** geen vaccin beschikbaar.

Algemene preventieve maatregelen

In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.

Omdat COVID-19 met name via druppels maar ook via handen, deurknoppen en andere voorwerpen wordt verspreid, zullen algemene hygienemaatregelen zoals handen wassen, hygiëne bij het bereiden van voedsel en dranken, nies-/hoest hygiëne et cetera, nuttig zijn om de transmissie te voorkomen en de epidemie te beperken. Deze maatregelen zullen het krijgen van COVID-19 niet volledig kunnen voorkomen. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een mond-neus-masker zijn enkel noodzakelijk voor medewerkers in de zorg. Zie hiervoor verder 'Preventieve maatregelen op het werk' .

Handhygiëne en reiniging conform de richtlijn [Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg](#).

Informatie over preventieve maatregelen ten aanzien van coronavirus in afvalwater vindt u op de [STOWA-website](#).

Preventieve maatregelen op het werk

Het concept gezamenlijk advies van de NVZ en het RIVM inzake de inzet van zorgprofessionals in ziekenhuizen tijdens een uitbraak van COVID-19, vindt u op de [RIVM-website](#).

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS-CoV-2 via druppels en (in)direct contact biedt een FFP1-masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19.

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals bijv. bronchoscopie, intubatie en handelingen die hoesten induceren. Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patiënten, met waarschijnlijk ook een hoge virusload, zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht, waarbij de gezondheidsmedewerker direct betrokken is, wordt voor de IC-zorg van een patiënt met COVID-19 om die reden een FFP2-masker geadviseerd.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Conform de richtlijn [Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg](#).