

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
 From: (10)(2e)
 Sent: Fri 3/13/2020 2:42:40 PM
 Subject: RE:
 Received: Fri 3/13/2020 2:42:00 PM

Ik zou op basis van het document van de leidraad voor ziekenhuizen nog iets willen toevoegen. (nu in paars)

Preventie Immunisatie

Er is **momenteel** geen vaccin beschikbaar.

Algemene preventieve maatregelen

In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.

Omdat COVID-19 met name via druppels maar ook via handen, deurknoppen en andere voorwerpen wordt verspreid, zullen algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, hygiëne bij het bereiden van voedsel en dranken, nies-/hoest hygiëne et cetera, nuttig zijn om de transmissie te voorkomen en de epidemie te beperken. Deze maatregelen zullen het krijgen van COVID-19 niet volledig kunnen voorkomen. Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals het gebruik van een mond-neus-masker zijn enkel noodzakelijk voor medewerkers in de zorg. Zie hiervoor verder 'Preventieve maatregelen op het werk'.

Handhygiëne en reiniging conform de richtlijn [Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg](#).

Informatie over preventieve maatregelen ten aanzien van coronavirus in afvalwater vindt u op de [STOWA-website](#).



Preventieve maatregelen op het werk

Het concept gezamenlijk advies van de NVZ en het RIVM inzake de inzet van zorgprofessionals in ziekenhuizen tijdens een uitbraak van COVID-19, vindt u op de [RIVM-website](#).

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van SARS-CoV-2 via druppels en (in)direct contact biedt een FFP1-masker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19.

Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen ontstaan zoals bijv. bronchoscopie, intubatie en handelingen die hoesten induceren. Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Aangezien op de intensive care de ernstig zieke patiënten, met waarschijnlijk ook een hoge virusload, zijn opgenomen en frequent aerosolvormende handelingen worden verricht, waarbij de gezondheidsmedewerker direct betrokken is, wordt voor de IC-zorg van een patiënt met COVID-19 om die reden een FFP2-masker geadviseerd. Patiënten dienen te worden verpleegd intramuraal in een eenpersoonskamer met de deur dicht en op een intensive care op een isolatiekamer. Bij onvoldoende capaciteit is cohortering aangewezen van bekende positieve patiënten. Gebruik medische hulpmiddelen patiëntgebonden of disposable.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Conform de richtlijn [Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg](#).

Specifiek voor intramurale patiëntenzorg gelden de volgende aanvullende adviezen:

Intensivering van reiniging en desinfectie van hand- en contactpunten in de patiëntenkamer naar tweemaal per dag. Contact oppervlakten in de onderzoeks- of behandelruimte worden na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd. Bij ontslag uit een patiëntenkamer vindt er een eindreiniging- en desinfectie plaats. De medewerkers dragen hierbij persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor de afvoer en verwerking van afval en linnengoed gelden de reguliere hygiëne maatregelen en bijpassende instructies van de schoonmaak- en facilitaire medewerkers.

Maatregelen voor overleden patiënt

Overleden patiënten worden na overlijden door medewerkers gewassen en verzorgd in persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierna gelden geen bijzondere maatregelen meer dan de standaard hygiëne maatregelen rond een stoffelijk overschot aangezien er geen druppels of aerosolen meer worden geproduceerd. Volg voor de

meest actuele informatie altijd Labinf@ct.