

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;
 (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Tue 5/12/2020 3:02:18 PM
Subject: RE: vraag over definitie van wanneer thuis blijven
Received: Tue 5/12/2020 3:02:19 PM

Hoi (10)(2e)

Snap ik het dan goed dat bij alleen koorts zonder klachten die passen bij COVID-19 NIET het hele gezin thuis hoeft te blijven?

Groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 11 mei 2020 11:22
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: vraag over definitie van wanneer thuis blijven

Klopt helemaal (10)(2e) Bij hooikoorts ben je over het algemeen niet benauwd, en bij een simpele verkoudheid ook niet.

Het gaat om een inschatting: hoe groot is de kans dat de klachten door COVID-19 komen? Die is groter als mensen ernstiger ziek zijn: een combinatie van koorts met luchtwegklachten, of ernstige luchtwegklachten (benauwdheid). Bij alleen koorts kan er goed sprake zijn van iets anders, belangrijk is dan natuurlijk ook wat voor klachten er nog meer zijn om te beoordelen wat er aan de hand is (koorts+ oorpijn, koorts+buikpijn etc).

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 11:15
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: vraag over definitie van wanneer thuis blijven

Zo had ik m juist wel begrepen.
 (Verkoudheids)klachten met benauwdheid is iedereen thuisblijven. Ook zonder koorts.

Maar daar kunnen (10)(2e) of (10)(2e) dan inderdaad misschien beter uitsluitsel over geven.

(Je bent toch niet echt benauwd bij hooikoorts?
 Overigens wordt ook gezegd door RIVM: als je bekend bent met hooikoorts en de klachten voelen nu precies hetzelfde, hoef je niet thuis te blijven. Maar bij enige twijfel, dan wel *)

Met vriendelijke groet,

Mw. (10)(2e), (10)(2e)
 Medisch adviseur RIVM-DVP West
 E (10)(2e) @rivm.nl
 T (10)(2e)
 Bereikbaar (10)(2e)

RIVM
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

RIVM-DVP West
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
 Signaalrood 15 | 2718 SH | Zoetermeer
 Postbus 654 | 2700 AR | Zoetermeer

www.rivm.nl
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 7 mei 2020 11:07
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: vraag over definitie van wanneer thuis blijven

Wij lezen 2 allebei als verkoudheidsklachten met koorts of verkoudheidsklachten met benauwdheid. Als je alleen verkoudheidsklachten met benauwdheid hebt hoeft toch niet je hele gezin thuis te blijven, denk aan hooikoorts?

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de tekst voor hielprik wel klopt.

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: donderdag 7 mei 2020 10:59
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>;
 (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: vraag over definitie van wanneer thuis blijven

Ik snap eigenlijk de verwarring niet precies.

Ik lees het dat er staat:

1. Blijf zelf thuis bij klachten van *of* verkoudheid *of* loopneus *of* niezen, etc etc etc
2. Als je een combinatie van verkoudheidsklachten *met* koorts *en/of met* benauwdheid, dan moet je niet alleen zelf thuis blijven (zie 1^e regel), maar moeten ook alle gezinsleden thuis blijven.

Punt 1 zijn dus lichte klachten zonder koorts of benauwdheid, punt 2 gaat over mensen die wel die alarmsymptomen hebben

Verhoging lijkt me juist wel tot 38 graden, dan val je nog onder groep 1, daarboven is het koorts (en val je dus onder groep 2).

Eigenlijk heeft dit maar beperkt te maken met de instructies voor screeners.
 Bovenstaande geldt namelijk voor de gewone burgers.

En dit zijn dus instructies voor de 'gewone' burgers.
 Dat is wat anders dan de instructies voor screeners over hielprik afnemen in een gezin waar mogelijk symptomen zijn.

Met vriendelijke groet,

Mw. (10)(2e), (10)(2e)
 Medisch adviseur RIVM-DVP West
 E (10)(2e)@rivm.nl
 T (10)(2e)
 Bereikbaar (10)(2e)

RIVM
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
 RIVM-DVP West

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
 Signaalrood 15 | 2718 SH | Zoetermeer
 Postbus 654 | 2700 AR | Zoetermeer

www.rivm.nl
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: woensdag 6 mei 2020 13:48
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: vraag over definitie van wanneer thuis blijven

Hoi allemaal,

Ik werd net gebeld door een oplettende jeugdarts die zich afvroeg hoe het onderste stukje van deze mededeling op de website <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19> gelezen moet worden. Ook in het licht van de hieprikscreening en CB-bezoek.

Er staat nu als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid.... Nu lijkt het alsof je met verkoudheidsklachten en benauwdheid thuis moet blijven. Terwijl wij allebei dachten dat het moet zijn met verkoudheidsklachten en/of benauwdheid met koorts..

Verder vroeg ze zich ook nog af wat te doen bij koorts zonder klachten van verkoudheid of benauwdheid, moeten deze mensen ook thuis blijven? Zo staat dat er nu niet.

Verder valt mij op dat er staat blijf thuis bij verhoging (tot 38 graden). Moet dit dan niet zijn blijf thuis bij verhoging (temperatuur van 38 graden of hoger)?

In de hiepriknieuws staat het volgens ons wel goed, daar staat: Wanneer in het huis een persoon is met klachten van hoesten en/of benauwdheid én koorts (>38 graden) of met een bevestigde corona-infectie, overleg dan met uw werkgever hoe de hiepriks veilig uitgevoerd kan worden.

(10)(2e) kun jij hier naar kijken en als het inderdaad niet klopt wat er nu staat zorgen dat het wordt aangepast?

Groeten,

(10)(2e)

Symptomen COVID-19

Klachten die veel voorkomen:

- Koorts
- Luchtwegklachten zoals hoesten
- Verkoudheid
- Niezen
- Kortademigheid

Blijf thuis bij:

- Neusverkoudheid
- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Lichte hoest
- Verhoging (tot 38 graden)

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

(10)(2e) (10)(2e)
 Medisch adviseur RIVM-DVP West
 T: (10)(2e)
 Intern T: (10)(2e)
 E: (10)(2e) @rivm.nl
 Bereikbaar (10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM - Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
 T (10)(2e)

RIVM-DVP West

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
 Signaalrood 15 | 2718 SH | Zoetermeer
 Postbus 654 | 2700 AR | Zoetermeer
 T (10)(2e)