

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ggdhaaglanden.nl
Cc: lchv (10)(2e) @rivm.nl; BCO-COVID19 (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Fri 5/29/2020 12:16:12 PM
Subject: RE: PBM VVT
Received: Fri 5/29/2020 12:16:12 PM

Hi (10)(2e),

Het is inderdaad een lastige vraag en er is geen eenduidig antwoord op. Het is toch aan de GDD om een juiste risico-inschatting te maken bij de medewerker, het is niet mogelijk om met zo veel variabelen dit vast te leggen in beleid/richtlijn. Toelichting:

- Afhankelijk van vele factoren zoals bijvoorbeeld, hoe ziek was de patiënt/ cliënt, wel of niet hoestend, welke handelingen werden er uitgevoerd, hoe lang was de periode van contact?
- Het risico op besmetting is zeker groter voor de zorgverlener bij directe transmissie via druppels in gelaat dus bij ontbreken masker en/ of bril
- Het risico op besmetting is kleiner voor de zorgverlener via de handen (zeker bij toepassen handhygiëne) en ontbreken schort maar levert wel groter risico op verspreiding naar omgeving/ andere bewoners.

Met vriendelijke groet,

In verband met de corona-hectiek is het mogelijk dat uw mail niet (direct) wordt beantwoord of dat uw vraag wordt behandeld door een van mijn collega's. Stuur niet noodzakelijke mail naar (10)(2e) @rivm.nl
 Excuses voor het ongemak,

met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)
 National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)
 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
 (10)(2e) | (10)(2e) @rivm.nl | info@lchv.nl | www.lchv.nl

N.b. Let op: bovenstaand advies is verstrekt als antwoord op een specifieke vraag en is daarom niet geldig in andere omstandigheden c.q. een andere setting.

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @ggdhaaglanden.nl>
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 18:32
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
CC: LCI <(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: PBM VVT

Hallo (10)(2e),

Wanneer wordt je als zorgmedewerker qua PBM-gebruik als beschermd (nauw) contact gezien en wanneer als onbeschermd (nauw) contact als je deels PBM hebt gebruikt?

Ik begrijp dat als je alles droeg (handschoenen, schort, IIR masker en bril) tijdens de zorgverlening <1,5 m, je als een beschermd contact gezien wordt. We gaan er even vanuit gaande dat de zorghandeling geen ffp2 vereist.

Maar wat als je alleen een IIR en handschoenen droeg? En de client blijkt covid positief te zijn. Ben je dan toch een overig nauw contact? Of val je dan helemaal buiten de contactenclassificatie?
 Of zou je dan als overig (niet nauw) contact bestempeld kunnen worden...?

Ik vraag dit omdat ik regelmatig hoor dat zorgmedewerkers in VVT standaard met een IIR op moeten werken. Of op afdelingen waar quarantaine heerst met handschoenen en een IIR (volgens Verenso-protocol). Nogmaals: in hoeverre zijn zij bij contact met een covid-patiënt dan beschermd of niet of deels beschermd...? En in welke contact-classificatie vallen ze dan?

En in geval zij als volledig beschermd worden gezien, wat is dan de bijdrage van de bril en het schort?

Ik vind 'm lastig.
Ik hoor graag van je.

Hartelijke groet,

(10)(2e) .



De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>