

<b>Factsheet Bron- en Contactonderzoek</b>	
Kernboodschap	<p>Op dit moment wordt door de GGD overal het klassieke bron- en contactopsporing (BCO) uitgevoerd. BCO is in samenhang met grootschalig testen belangrijk in de overgangsfase om de situatie goed te monitoren en opflakeringen van het virus snel de kop in te drukken.</p> <p>De GGD'en hebben een opschalingsplan gepresenteerd over hoe zij vanaf 1 juni opgeschaald zijn om de toename in het aantal BCO op te vangen.</p> <p>Met dit opschalingsplan zijn de GGD'en gereed om de extra vraag naar BCO aan te kunnen.</p> <p>Momenteel werken RIVM en GGD het stappenplan nader uit, waarbij zowel huisgenoten als nauwe contacten mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd en zij meerdere malen worden gebeld na het oorspronkelijk contact. Het RIVM stelt dit aangepaste protocol deze week vast.</p> <p>De GGD past de berkening van de capaciteit nog aan, zodat ook de capaciteit voor het nabellen van contacten die voortkomen uit het BCO hierin wordt meegenomen. Het aangepast plan volgt begin volgende week.</p>
Achtergrond	<p><b>BCO</b></p> <p>De GGD voert BCO rond een bevestigde patiënt uit met als doel het identificeren en inlichten van contacten en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiëne, thuis blijven en laten testen bij klachten. De GGD identificeert drie categorieën contacten: huisgenoten, overige nauwe contacten en overige contacten. Huisgenoten (iedereen de woonomgeving deelt en langdurig contact had op minder dan 1,5m afstand) worden geadviseerd om veertien dagen in quarantaine te gaan. Overige nauwe contacten (iedereen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5m afstand contact had) wordt dringend geadviseerd om veertien zoveel mogelijk thuis te blijven. Overige contacten (iedereen die langer dan 15 minuten contact had op meer dan 1,5m afstand) worden gevraagd om extra alert te zijn op klachten passend bij Covid-19. Deze adviezen worden zowel schriftelijk als mondeling toegelicht.</p> <div data-bbox="564 1025 1259 1290" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <pre> graph TD     A[1 Isolatie van de patiënt] --&gt; B[2 Bron- en contactonderzoek]     B --&gt; C[3 Contact en instructies voor contacten]     C --&gt; D[4 Bij ziekteverschijnselen] </pre> <p>1 Isolatie van de patiënt</p> <p>2 Bron- en contactonderzoek (binnen 24 uur na melding) met personen waar de patiënt contact mee heeft gehad en locatie/persoon waar de infectie vermoedelijk is opgelopen.</p> <p>3 Contact en instructies voor contacten (Delen van leefregels, vragen om alertheid en snel handelen bij ziekteverschijnselen).</p> <p>4 Bij ziekteverschijnselen bij een van de contacten worden de stappen herhaald (best possible: isolatie &gt; BCO &gt; instructies).</p> </div> <p><b>Opschalingsplan</b></p> <p>15 mei hebben de GGD'en het opschalingsplan gepresenteerd waarin zij hebben aangegeven hoe het BCO per 1 juni opgeschaald is om het bovengrensscenario aan te kunnen. Dit scenario gaat uit van 30.000 testen per dag en 8% positieve testuitslagen. Hiertoe is 2400 BCO per dag nodig. Dit betekent 3200 fte. De GGD'en zijn per 1 juni regionaal opgeschaald naar 800 fte en hebben dan een flexibele schil beschikbaar om tot de 3200 fte te komen. 800 fte is genoeg voor het ondergrensscenario, waarin uitgegaan wordt van 2% positieve testuitslagen.</p> <p>Naast het opschalen van de BCO capaciteit, passen het RIVM en de GGD nu ook het BCO protocol in. Met deze aanpassing wordt ervoor gezorgd dat er contact onderhouden wordt met personen die uit een BCO naar voren komen. Dit betekent dat mensen op maat mensen gebeld zullen worden met als doel het monitoren van verdere ontwikkeling van ziekteverschijnselen en om zicht te houden op de naleving van maatregelen. Iedereen wordt in principe op dag 7 en dag 14 na het BCO gebeld, hoogrisicogroepen worden vaker gebeld.</p>

Overig (zoals heikele punten en pers)	<p>In de pers is veel aandacht uitgegaan naar het opschalingsplan van de GGD'en. Dit betref voornamelijk feitelijke omschrijvingen van het plan.</p> <p>In Duitsland worden bezoekersgegevens in horecagelegenheden gebruikt voor het BCO. De Europese Commissie adviseert ook deze gegevens voor 14 dagen te bewaren. Deze gegevens kunnen BCO verrijken, maar mogen volgens de AVG alleen op vrijwillige basis verzameld worden. Er wordt nog besproken of dit ook in Nederland van toegevoegde waarde kan zijn.</p> <p>Eerder is de indruk ontstaan dat de GGD het nut van bron- en contactopsporing niet helemaal ziet en wacht op een opdracht van het kabinet. Mocht dit opnieuw opkomen, is het van belang om aan te geven dat het gaat om afspraken met het kabinet bijvoorbeeld over financiering van de enorme extra inzet – maar dat de GGD eigenstandig verantwoordelijk is voor BCO op basis van de LCI richtlijn.</p>
--	---

Contactopsporing	Opvolgen	Handelingsperspectief	En
<b>Voor 12 maart</b>	Hoogrisicocontacten zonder symptomen ontvangen van de GGD een informatiebrief	Gezinsleden moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen. Zij mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Alert te zijn op luchtwegklachten. Eenmaal per dag hun temperatuur te meten en dagelijks hun gezondheidssituatie door te geven aan de controlerende instantie	Hygiëne, geen handen schudden
<b>Vanaf 12 maart</b>	Basis: de GGD stelt besmette persoon op de hoogte en vraagt hen contacten op de hoogte te stellen	De GGD voert contactonderzoek rond een bevestigde patiënt uit met als doel het inlichten van contacten, met name uit groepen met een verhoogde kans op ernstig beloop, en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiëne en thuis blijven bij klachten	Hygiëne, geen handen schudden. Iedereen blijft thuis!
<b>Vanaf 6 mei (verscherping vanaf nu)</b>	Huisgenoten De GGD informeert huisgenoten (inclusief kinderen) mondeling en schriftelijk met het advies om:	Twee weken na het laatste contactmoment in quarantaine dus strikt thuisblijven; Alert op klachten Bij vermoeden van koorts temperaturen; GGD bellen bij koorts Bereikbaar te zijn voor de GGD tijdens deze quarantaineperiode. <b>De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden,</b>	Goede hoest- en handhygiëne

		<p><b>indien de klachten passen bij COVID-19.</b></p> <p>De GGD heeft aan het eind van de quarantaineperiode contact met de huisgenoot en sluit de monitoring af.</p>	
	<p>Overige nauwe contacten (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m afstand). GGD informeert overige nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het advies om:</p>	<p>Twee weken na het laatste contactmoment zoveel mogelijk thuisblijven (thuiswerken, geen ov, geen bezoek).</p> <p>Minimaal 1,5m afstand houden van andere mensen.</p> <p>Alert op klachten</p> <p>Bij vermoeden van koorts temperaturen; GGD bellen bij koorts.</p> <p><b>De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19.</b></p> <p>De GGD heeft aan het eind van de quarantaineperiode contact met het nauwe contact en sluit de monitoring af.</p>	<p>Goede hoest- en handhygiëne</p>
	<p>Overige contacten (meer dan 15 minuten op meer dan 1,5m afstand). GGD informeert overige contacten met het advies om:</p>	<p>Algemene maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen (social distancing).</p> <p>Alert op klachten</p> <p>Bij vermoeden van koorts temperaturen; GGD bellen bij koorts en dan thuis blijven.</p> <p><b>De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19.</b></p>	<p>Goede hoest- en handhygiëne</p>