

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Thur 2/4/2021 10:48:34 AM  
**Subject:** RE: vraag vanuit voorwacht tav RL  
**Received:** Thur 2/4/2021 10:48:34 AM

Hi [5.1.2e]

In principe is het uiterlijk 6 weken. Je kan erover heengaan als iemand COVID krijgt/SARS-2-CoV-2 positief is in het interval tussen twee vaccinaties. Dit zal (vrijwel altijd) zijn in de eerste 2 weken na de eerste vaccinatie. Dan adviseren wij 4 weken te wachten, maar blijf je alsnog binnen de 6 weken. Uitzonderingen kunnen eerder, zodra in ieder geval de symptomen weg zijn. Een hele tweede vaccinatie langer uitstellen is niet het advies.

Ook voor zwangeren gewoon na uiterlijk 6 weken.

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 4 februari 2021 11:05  
**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Subject:** vraag vanuit voorwacht tav RL  
**Importance:** High

Hi [5.1.2e] en [5.1.2e]

Zojuist in onze LCI Taskforce bespreking nog discussie over volgende punt:  
Interval tussen 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> vaccinatie met Pfizer mag volgens onze RL niet langer zijn dan 6 weken.

- Hiervoor zijn toch geen uitzonderingen?
- Bijv een verpleeghuisinstelling met nu een uitbraaksituatie; zij stellen 2<sup>e</sup> vaccinatie uit en gaan dan over de 6 weken heen. En vragen dan hoe zij ook na die 6 weken aan vaccins kunnen komen om als nog die 2<sup>e</sup> vacc te zetten.
- Voor zwangeren die onbedoeld (je wist nog niet dat je zwanger was) gevaccineerd zijn, zeggen we dat ze dan later na de zwangerschap een 2<sup>e</sup> vaccinatie kunnen krijgen. In hoeverre is dat dan in lijn met niet later dan na 6 weken interval 2<sup>e</sup> vaccinatie. In hoeverre willen we dit nu in de RL stellig zeggen?
- Etc

Oftewel, geldt niet interval niet langer dan 6 weken voor alle situaties?

Kunnen jullie dit nog meenemen in de bespreking vanochtend?  
Bel me anders als het niet duidelijk is qua vraagstelling.

Groet,

[5.1.2e]