

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted]
Sent: Mon 2/22/2021 3:16:04 PM
Subject: RE: adviserende rol in het beoordelen van ontheffingsaanvragen antigeentesten als zelftest
Received: Mon 2/22/2021 3:16:05 PM

Klopt [redacted]

[redacted]

Alles staat of valt idd met de communicatie over wat je doet met de uitslag. In de GGD teststraten krijg je een folder mee met wat je moet doen, en als je positief test belt de GGD je met instructies. Dat moet bij zelftesten op een andere manier geborgd worden. Geldt ook voor de meldplicht trouwens.

Groet, [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Sent: maandag 22 februari 2021 15:57

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: RE: adviserende rol in het beoordelen van ontheffingsaanvragen antigeentesten als zelftest

Hoi [redacted]

In de presentatie van [redacted] hebben ze data omtrent hoe goed de sneltesten werken tov zelfgebruik. Ik was halverwege de presentatie binnen gekomen door de technische problemen, maar misschien dat [redacted] de hele presentatie ook heeft (RIVM heeft de kweek data gedaan).

Wat ik begreep van de studie is dat er veel haken en ogen zijn aan het zelf testen. De testen misten veel, maar [redacted]. Er waren ook veel invalid testen als ik zo goed zag

Belangrijk bij zelftesten is de communicatie naar het gedrag van mensen bij een negatieve Ag test. Zou de gedragsunit dit niet kunnen uitvragen net als de vragen die ze nu stellen over vaccinatie?

Wat betreft het gebruik van de testen. de NSP swab is wel erg gevoelig voor slechte afname. Niet diep genoeg of goed genoeg swabben, kan al de prestatie beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat mensen bij zelfafname met een NSP niet diep genoeg gaan en dan een slechte test, dan wel invalid test. [redacted], dus dat kan ook bij onprofessionele afname mee spelen.

Een minder diepe afname zoals de nasale swab zou afname vergemakkelijken en kans op foute testen verminderen. Nasale afname is dan weer minder gevoelig dan NSP. Ander zou je kunnen denken aan een soort dubbele test (nasale en NSP afname?) of dat ze minimaal 3 afnames moeten doen.

[redacted]

[redacted]

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

P.O.Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dubbel

De volgende 4 pagina's zijn verwijderd i.v.m. dubbel.