

To: [redacted]@amsterdamumc.nl [redacted]@amsterdamumc.nl
Cc: [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 2/3/2021 1:52:24 PM
Subject: RE: vragen IGJ
Received: Wed 2/3/2021 1:52:24 PM

Geachte mevrouw [redacted]

Onderstaande vraag kreeg ik intern doorgestuurd en wil ik graag beantwoorden.

Er was vanuit het veld behoefte aan handvatten voor beoordelen van gebruik van juiste naaldlengte. Dit was de aanleiding voor ons om hiervoor handvatten te bieden in de richtlijn. Echter de beoordeling of een langere naald noodzakelijk is, is aan degene die vaccineert. Daar voor is de richtlijn een leidraad. Uiteraard kan degene die vaccineert zelf ter plekke bij de client het best beoordelen welke naaldlengte gebruikt moet worden en hierin een eigen afweging maken.

Wat betreft besluiten tot een 3^e vaccinatie indien bij de 2^e vaccinatie toch een langere naaldlengte dan bij de 1^e vaccinatie nodig blijkt, volgt een aanpassing in de nieuwe versie van de richtlijn, die naar verwachting as vrijdag online komt. Deze zal niet meer geadviseerd worden, om te voorkomen dat de bijwerkingen (die in praktijk vaak bij de 2^e vaccinatie al meer uitgesproken kunnen zijn dan na de 1^e vaccinatie) bij een 3^e vaccinatie nog hevig zouden kunnen zijn. Voor de definitieve formulering van deze wijziging, verwijs ik u graag naar de nieuwe versie van de richtlijn die spoedig verschijnt.

Hopelijk is uw vraag hiermee beantwoord.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

Postbus 1 [redacted]

3720 BA Bilthoven

Tel: 030 - [redacted]

www.rivm.nl

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Dubbel

[redacted]

De volgende 3 pagina's zijn verwijderd i.v.m. dubbel.