

From: [redacted]
To: [redacted]
Subject: Antw: terugkoppeling
Date: maandag 23 maart 2020 14:47:15

Heel goed, logisch zo [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: 23 maart 2020 om 14:27:35 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: terugkoppeling

Hoi [redacted]

In het kort even terugkoppeling. Ik heb met [redacted] gesproken en ze gaf aan het ook niet helemaal eens te zijn met alle adviezen in het UK document. Waar we wel op uit kwamen is (ook ondersteund door internationale protocollen) dat een infectie gelijk getrokken mag worden aan de andere respiratoire virale infecties zoals influenza en in het derde trimester onwenselijk is te krijgen door twee redenen:

- Koorts in derde trimester is onwenselijk
- Virale pneumonie in derde trimester is onwenselijk. Vanwege de mechanische beperking van de grote buik verloopt een virale pneumonie vaak ernstiger (eigenlijk gelijk aan niet-zwangeren maar die hebben meestal niet zo'n dikke buik).

Beleid om verder uit te werken:

Wanneer iemand niet kan garanderen zich te houden aan de preventiemaatregelen en dan met name de social distancing van >1,5 meter en direct patiënten/personencontact heeft, is het advies om in het derde trimester ander werk te doen. Maar dus niet advies aan alle zwangeren om vanaf 28 weken thuis te gaan zitten of zich te beschouwen als ICP

Dit gaan we uitwerken en kortsluiten met de KNOV en NVOG.

Groeten en dank voor je input net.

Vriendelijke groet, [redacted]

--
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T: [redacted]
E: [redacted]@rivm.nl
I: www.rivm.nl/infectieziekten