

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]; [REDACTED]
Subject: RE: [Spam] Brief m.b.t. zwangerschap, werk en COVID19
Date: dinsdag 16 juni 2020 13:29:07
Attachments: [20206011 Brief aan RIVM mbt zwangerschap-werk-Covid19 - antwoorden.docx](#)

Hoi [REDACTED]

In de bijlage een voorzet met antwoorden op de vragen van de bedrijfsartsen. Ik zie jullie feedback graag tegemoet!

Groeten,
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: dinsdag 16 juni 2020 10:43
To: [REDACTED]; [REDACTED]
Subject: RE: [Spam] Brief m.b.t. zwangerschap, werk en COVID19

Wat goet [REDACTED], goede aanvullingen. Vnl ook voor de reactie naar de bedrijfsartsen. Die jij voorzet hiermee in de bijlagetekst (waar van toepassing)?

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
T 030 - [REDACTED]
www.rivm.nl/infectieziekten

From: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 16 juni 2020 10:39
To: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
<[REDACTED]@rivm.nl>
Subject: RE: [Spam] Brief m.b.t. zwangerschap, werk en COVID19

Hallo beiden,

Heb even wat werk gedaan:

- KNOV: heeft onze bijlage letterlijk overgenomen en moeten dus net als NVK etc geïnformeerd worden als wij de richtlijn aanpassen. Zie https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3395/file/20-03-25_RIVM_Zwangerschap_werk_en_COVID-19.pdf
- 15 min: dit wordt zowel nationaal als internationaal gehanteerd: Data are insufficient to precisely define the duration of time that constitutes a prolonged exposure. Recommendations vary on the length of time of exposure, but 15 minutes of close exposure can be used as an operational definition. Echter, een onderzoek laat zien dat 5 minuten in dezelfde kamer met iemand met klachten ook

twee keer verhoogd rico geeft:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194223/pdf/wellcomeopenres-5-17321.pdf>

- In NL staat dit 15-minutenbeleid op verschillende plekken en wordt gehanteerd in divers beleid en in de definities m.b.t. contacten, het komt denk ik vanuit MERS beleid. Zie bijv de COVID richtlijn, de BCO richtlijn: <https://ci.rivm.nl/COVID-19-bco> etc.
- Verder nog van belang dat uit dit onderzoek komt (Swiss weekly) dat contact tussen HCW en patiënt bijna altijd < 15 minuten is en dus minder transmissierisk: <https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20257>
- Nog aantal studies: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32391519/>,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430957/>,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259279/>
- Grtjs 5.1.2e

