

Volgnummer: 29462

Onderwerp: COVID-19-vaccin

Aanmaakdatum: 23-01-2021

Casushouder:

Laatst gewijzigd: 24-01-2021

23-01-2021 -

Situatie:

5.1.2e bedrijfsarts, belt een casus door van ernstige allergie bij een van de zorgmedewerkers die is gevaccineerd. Client is vrouw met VG lichte all voor katten en paarden.

Zij heeft Pfizervaccin 1e vaccinatie gekregen. Kreeg na 3,5-4 uur rode uitslag en jeuk in het gezicht (herkende dit van de bekende allergieën), maar daarna ontstonden ook hartkloppingen, hyperventilatie en een bloeddrukdaling. Daarbij is ambulance gebeld en kreeg zij binnen 15 minuten adrenaline toegediend. Klachten kwamen nog twee keer terug. Is daarop meegenomen naar de SEH ter observatie. heeft nog medicatie gehad (onbekend). En kon na aantal uren naar huis, antihistaminicum meegekregen. Nadien geen klachten.

Vraag:

Mag deze mw het 2e vaccin krijgen?

Overweging:

Conform eerdere casus (nr 29397) geadviseerd om mensen met duidelijk allergische reactie op het vaccin de 2e vaccinatie niet te halen. Afhankelijk van de noodzaak / wens om toch gevaccineerd te worden zou dit onder gecontroleerde omstandigheden nog kunnen, maar dat moet dan in overleg met de uitvoerders in een dergelijke setting.

Antwoord:

Bovenstaande overweging gedeeld. Is geholpen met dit advies.