

Volgnummer: 29235

Onderwerp: COVID-19-vaccin

Aanmaakdatum: 08-01-2021

Casushouder:

Laatst gewijzigd: 08-01-2021

08-01-2021 -

Situatie:

Beste meneer, mevrouw,

Ik ben 5.1.2e en na overleg met uw infolijn mail ik mijn vraag hierbij nogmaals.

Een patient van mij is opgeroepen voor vaccinatie met het Pfizer vaccin voor COVID-19. Patiënt gebruikt echter zowel rivaroxaban 1dd 20mg en clopidogrel 1dd 75mg. Op <https://ci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#4- contra- indicaties- en- aandoeningen- die- aandacht- vragen- bij- alle- covid- 19- vaccins> staan er wel adviezen bij gebruik van 1 van deze middelen maar maakt het nog wat uit als het in combinatie wordt gebruikt of mag ik dan dezelfde adviezen hanteren?

Graag hoor ik van u, waarvoor dank.

Mvg,

5.1.2e

Overweging:

vraag doorgespeeld aan 5.1.2e LCR. 5.1.2e heeft het stuk over DOAC geschreven voor de richtlijn

Beste 5.1.2e

Graag wil ik je expertise vragen over een vraag ten aanzien van gebruik van DOAC en COVID-19 vaccinatie.

We kregen onderstaande vraag binnen: is de combinatie met een andere antistollingsmiddel (in dit geval clopidrogel) een probleem?

Levert de combinatie van middelen in dit geval (of andere combinaties) een probleem op? Of kunnen we de adviezen per middel gewoon hanteren?