

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Tue 1/19/2021 3:35:24 PM
Subject: RE: Correctie advies over interval eerste en tweede vaccin
Received: Tue 1/19/2021 3:35:25 PM

Hi [redacted]

Misschien was ik net niet duidelijk, maar de redenatie hier achter is net iets anders.

Het is niet zozeer omdat je verwarring krijgt tussen klachten van COVID met mogelijke bijwerkingen. Dat probeer je al te voorkomen door ip pas vaccineren als iemand weer hersteld is van klachten door COVID. Dus dat hadden we afgelopen maandag besproken niet als argument te zien.

Maar het interval van 4 weken is door WHO geadviseerd, omdat een korter interval er voor lijkt te zorgen dat bijwerkingen op de 2^e vaccinatie heviger kunnen zijn. Dit zijn signalen, maar is nog niet met een duidelijke onderbouwing terug te lezen. Mogelijk door te snel te vaccineren, treedt er meer reactogeniciteit op door het feit dat na net doorgemaakte COVID je eigen immuunrepons zeer actief "aan" staat.

Groet,

[redacted]

