

**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** Tue 1/19/2021 3:45:51 PM  
**Subject:** RE: Correctie advies over interval doorgemaakte infectie en tweede vaccin  
**Received:** Tue 1/19/2021 3:45:52 PM

Dank je [redacted] duidelijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
 [redacted]  
 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 19 januari 2021 16:35  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Correctie advies over interval eerste en tweede vaccin

Hi [redacted]

Misschien was ik net niet duidelijk, maar de redenatie hier achter is net iets anders.

Het is niet zozeer omdat je verwarring krijgt tussen klachten van COVID met mogelijke bijwerkingen. Dat probeer je al te voorkomen door ip pas vaccineren als iemand weer hersteld is van klachten door COVID. Dus dat hadden we afgelopen maandag besproken niet als argument te zien.

Maar het interval van 4 weken is door WHO geadviseerd, omdat een korter interval er voor lijkt te zorgen dat bijwerkingen op de 2<sup>e</sup> vaccinatie heviger kunnen zijn. Dit zijn signalen, maar is nog niet met een duidelijke onderbouwing terug te lezen. Mogelijk door te snel te vaccineren, treedt er meer reactogeniciteit op door het feit dat na net doorgemaakte COVID je eigen immuunrepons zeer actief "aan" staat.

Groet,

[redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 19 januari 2021 16:22  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** Correctie advies over interval eerste en tweede vaccin

Hoi allen,

Zojuist in de wrap up besproken dat het interval tussen een doorgemaakte covid-19 infectie en tweede vaccinatie toch niet flexibel is, maar minimaal vier weken is. Vandaag heb ik ook een ziekenhuis gemaïld met dat dit wel flexibel is nav het casuïstiek overleg. Kunnen we een correctie bericht maken wat we naar deze partijen kunnen sturen? Met onderbouwing dat de WHO toch aangeeft dat dit niet kan vanwege de verwarring van symptomen met de mogelijke bijwerkingen van het vaccin?

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
 [redacted]  
 .....  
 RIVM – Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 – 3720 BA Bilthoven

T: + 31 [redacted] 5.1.2e | M: + 31 [redacted] 5.1.2e

E: [redacted] 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)

[redacted] 5.1.2e

---



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport