

**Cc:** 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] @rivm.nl];  
**To:** 5.1.2e [redacted] @hotmail.com]; 5.1.2e [redacted] @hotmail.com]; 5.1.2e [redacted] @hotmail.com]; 5.1.2e [redacted] @hoharuba.com]; 5.1.2e [redacted] @bonairegov.com]; 5.1.2e [redacted] @bonairegov.com]; 5.1.2e [redacted] @hoharuba.com]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @outlook.com]; 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @despa.gov.aw]; 5.1.2e [redacted] @statiagov.com]; 5.1.2e [redacted] @statiagov.com]; 5.1.2e [redacted] @gobiernu.cw]; 5.1.2e [redacted] @gobiernu.cw]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @sabagov.nl]; 5.1.2e [redacted] @sabagov.nl]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @xs4all.nl]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @bonairegov.com]; 5.1.2e [redacted] @gobiernu.cw]; 5.1.2e [redacted] @statiagov.com]; 5.1.2e [redacted] @statiagov.com]; 5.1.2e [redacted] @hotmail.com]; 5.1.2e [redacted] @hotmail.com]; 5.1.2e [redacted] @statiagov.com]; 5.1.2e [redacted] @statiagov.com]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [redacted] @despa.gov.aw]; 5.1.2e [redacted] @despa.gov.aw]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @gmail.com]; 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] @gobiernu.cw];

**From:** 5.1.2e [redacted]  
**Sent:** Mon 3/8/2021 9:26:45 AM  
**Subject:** FW: [COVID-19] Points épidémiologiques régionaux Antilles  
**Received:** Mon 3/8/2021 9:26:46 AM  
[Guadeloupe-SaintMartin-SaintBarthelemy\\_COVID19\\_PER N°41 SpFAntilles.pdf](#)  
[Martinique\\_COVID19\\_PER N°41 SpFAntilles.pdf](#)

Beste college,  
 Bijgaand de resultaten van de Franse surveillance in de regio. Ook toename van de Engelse variant.  
 Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

#### Covid 19-bewaking

**Guadeloupe:** Surveillance-indicatoren zijn vorige week gestegen tot hoge niveaus. Het incidentiepercentage lag boven de alarmdrempel en het positiviteitspercentage dicht bij de alarmdrempel. Ook werd een toename waargenomen van het aantal clusters met een groot aantal positieven. Het bewijs van actieve circulatie van de Engelse variant (20I / 501Y.V1) sinds begin februari in Guadeloupe verklaart gedeeltelijk deze stijgende trend. Vanaf 5 maart was de R-effectief berekend op basis van SI-DEP-gegevens van de afgelopen 7 dagen significant groter dan 1: 1,43 [1,30-1,56].

Van de gescreende positieve tests die beschikbaar waren in SI-DEP voor Guadeloupe, kwam 70,0% overeen met een vermoedelijke Engelse variant (20I / 501Y.V1). Met betrekking tot vaccinatie is het voltooiingspercentage, dat wil zeggen de daadwerkelijke toegang tot het Covid Vaccine-informatiesysteem, te laag om weer te geven.

**Martinique:** De epidemiologische indicatoren van SARS-CoV2 in Martinique duiden op een toename van de virale circulatie in de bevolking, zonder impact tot nu toe op het gezondheidszorgsysteem. Dit zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden door een actieve circulatie van de Engelse variant (20I / 501Y.V1), gedetecteerd door RT-PCR-screening, en een toename van de behoefte aan screening. Deze trend wordt volgende week bevestigd.

Gezien deze situatie moet de waakzaamheid worden versterkt door handhaving van individuele preventiemaatregelen en maatregelen om contact te verminderen. Het grondgebied blijft geclassificeerd als een hoog kwetsbaarheidsniveau.

**Saint-Barthélemy:** De epidemiologische surveillance-indicatoren waren de afgelopen twee weken stabiel. Actieve circulatie van het virus op het eiland is aanwezig. Een stille autochtone circulatie van de Engelse variant (20I / 501Y.V1) wordt momenteel geïdentificeerd. Gezien de kleine omvang van de populatie, dient de incidentie met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.


**Saint-Martin:** Er is gedurende twee weken een afname van de bewakingsindicatoren waargenomen. Sinds eind januari zijn er geïsoleerde gevallen van de Engelse variant (20I / 501Y.V1) geconstateerd. Deze neerwaartse trend zal de komende weken moeten worden bevestigd.

From:

5.1.2a <5.1.2e@santepubliquefrance.fr>  
 Sent: vrijdag 5 maart 2021 23:38  
 To: 5.1.2a <5.1.2e@santepubliquefrance.fr>  
 Subject: [COVID-19] Points épidémiologiques régionaux Antilles

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint les points épidémiologiques relatifs à la situation de la Covid-19 dans nos territoires :



## Surveillance de la Covid 19

**Guadeloupe :** Les indicateurs de surveillance ont augmenté pour atteindre des niveaux élevés la semaine dernière. Le taux d'incidence était supérieur au seuil d'alerte et le taux de positivité proche du seuil d'alerte. Une augmentation du nombre de clusters regroupant un nombre important de positifs était également observée. La mise en évidence d'une circulation active du variant anglais (20I/501Y.V1) depuis début février en Guadeloupe explique en partie cette tendance à l'augmentation. Au 5 mars, le R-effectif calculé à partir des données SI-DEP sur les 7 derniers jours était significativement supérieur à 1 : 1,43 [1,30-1,56]. Parmi les tests positifs criblés disponibles dans SI-DEP pour la Guadeloupe, 70,0 % correspondaient à une suspicion de variant anglais (20I/501Y.V1). Concernant la vaccination, le taux de complétion c'est-à-dire la saisie effective dans le système d'information Vaccin Covid est trop faible pour être affiché.

**Martinique :** Les indicateurs épidémiologiques du SARS-CoV2 en Martinique indiquent une augmentation de la circulation virale dans la population, sans impact à ce jour sur le système de soins. Celle-ci pourrait en partie s'expliquer par une circulation active du variant anglais (20I/501Y.V1) détecté par RT-PCR de criblage et une augmentation du recours au dépistage. Cette tendance sera à confirmer la semaine prochaine. Compte tenu de cette situation, la vigilance doit être renforcée en maintenant les mesures individuelles de prévention et les mesures de réduction des contacts. Le territoire reste classé en niveau de vulnérabilité élevée.

**Saint-Barthélemy :** Les indicateurs de surveillance épidémiologique étaient stables au cours des deux dernières semaines. Une circulation active du virus sur l'île est bien présente. Une circulation autochtone à bas bruit du variant anglais (20I/501Y.V1) est actuellement identifiée. Au vu des effectifs faibles de la population, le taux d'incidence doit être interprété avec précaution.

**Saint-Martin :** Une diminution des indicateurs de surveillance est observée depuis deux semaines. Des cas isolés du variant anglais (20I/501Y.V1) sont détectés depuis fin janvier. Cette tendance à la diminution devra être confirmée au cours des prochaines semaines.

Bonne réception,

L'équipe de Santé publique France Antilles  
 Si vous souhaitez que les points épidémiologiques soient diffusés à vos collaborateurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer leurs coordonnées par retour de mail.  
 Vous pouvez vous désinscrire de cette diffusion par simple retour de mail.

Un catalogue présentant des outils d'informations et de prévention de la covid 19 (affiches, fiches, spots audios) à des destination du grand public et des professionnels de santé est disponible au lien suivant :  
<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-fliver/covid-19-supports-d-information-grand-public.-catalogue-ianvier-2021>



Direction des régions  
Antilles  
Tél. : 05 5.1.2e  
5.1.2e @santepubliquefrance.fr

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

<p>Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique</p>	<p>Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir</p>	<p>Se mouchoir dans un mouchoir à usage unique puis le jeter</p>	<p>Eviter de se toucher le visage</p>	<p>Respecter une distance d'un mètre avec les autres</p>
<p>Eviter tout contact de main et éviter les embrassades</p>	<p>Porter un masque chirurgical ou équivalent de manière appropriée à distance de deux mètres ou plus (si applicable)</p>	<p>Limiter les déplacements aux contacts sociaux (6 semaines)</p>	<p>Adopter les gestes de saluabilité, au minimum quatre minutes (handshakes)</p>	<p>Utiliser les outils numériques (Zoom/Teams)</p>

>> Retrouvez-nous sur 