



5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

030 5.1.2e | Mob. +316 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl | www.rivm.nl

From: 5.1.2a <5.1.2e@santepubliquefrance.fr>
Sent: vrijdag 19 februari 2021 19:38
To: 5.1.2a <5.1.2e@santepubliquefrance.fr>
Subject: [COVID-19] Points épidémiologiques régionaux Antilles

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint les points épidémiologiques relatifs à la situation de la Covid-19 dans nos territoires :



Surveillance de la Covid 19

Guadeloupe : Les indicateurs de surveillance virologique étaient en augmentation la semaine dernière (2021-06), en comparaison avec les semaines précédentes. La mise en évidence d'une circulation à bas bruit du nouveau variant UK fin janvier en Guadeloupe pourrait en partie l'expliquer. Les autres indicateurs de surveillance (passages aux urgences, hospitalisations tous services et en réanimation) et en médecine libérale restaient stables. Le taux de positivité était à la limite du seuil de vigilance de 5 % et le taux d'incidence proche du seuil d'alerte de 50/100 000 hab.

Martinique : Les indicateurs épidémiologiques du SARS-CoV2 en Martinique indiquaient toujours une circulation virale stable. En médecine de ville et à l'hôpital, l'activité liée à la Covid-19 restait faible. Le virus restait cependant actif. Une circulation autochtone à bras bruit du nouveau variant UK a été identifiée sur notre territoire depuis fin janvier 2021. La vigilance doit rester de mise dans les semaines à venir en maintenant les mesures de prévention individuelles et de réduction des contacts.
 Le territoire reste classé en niveau de vulnérabilité élevée.

Saint-Barthélemy : Les indicateurs de surveillance virologique étaient stables à des niveaux élevés depuis début janvier (semaine 2021-01), reflétant ainsi une circulation active du virus sur l'île. Les premiers cas isolés du nouveau variant UK ont été identifiés mi-janvier. Le taux d'incidence était supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000 hab. et le taux de positivité était inférieur au seuil de vigilance de 5 %. Au vu des effectifs faibles de la population, le taux d'incidence doit être interprété avec précaution.

Saint-Martin : Les indicateurs de surveillance virologique étaient en légère augmentation en semaine 2021-06. Le taux d'incidence était supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000 hab. et le taux de positivité était supérieur au seuil de vigilance de 5 %. En milieu hospitalier, le nombre de passages aux urgences augmentait légèrement par rapport à la semaine précédente. En médecine libérale, le nombre de consultations était stable depuis mi-janvier (semaine 2021-02). Les premiers cas isolés du

nouveau variant UK ont été identifiés fin janvier. Le virus circule de manière active et cette situation doit être suivie avec attention.

Bonne réception,

L'équipe de Santé publique France Antilles

Si vous souhaitez que les points épidémiologiques soient diffusés à vos collaborateurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer leurs coordonnées par retour de mail.

Vous pouvez vous désinscrire de cette diffusion par simple retour de mail.

Un catalogue présentant des outils d'informations et de prévention de la covid 19 (affiches, fiches, spots audios) à des destination du grand public et des professionnels de santé est disponible au lien suivant :

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-suppports-d-information-grand-public-catalogue-janvier-2021>



**Santé
publique
France**

Direction des régions
Antilles
Tél. : 05 5.1.2e
5.1.2e @santepubliquefrance.fr

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

 Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hygiène alcoolisée	 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir	 Se tenir à distance à moins de 1 mètre	 Éviter de se toucher le visage	 Respecter une distance d'au moins 2 mètres avec les autres
 Utiliser sans arrêt le masque et éviter les embrassades	 Porter un masque chirurgical ou équivalent de manière correcte et à distance de au moins 1 mètre	 Limiter au maximum les contacts sociaux (6 maximum)	 Éviter les places le plus souvent possibles, au maximum uniquement attaches sécurisées	 Utiliser les outils numériques (Téléconférence)

Retrouvez-nous sur    