

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Sun 1/3/2021 3:19:09 PM  
**Subject:** FW: vaccinatie na corona infectie  
**Received:** Sun 1/3/2021 3:19:09 PM

Ter info, zie hieronder. Mochten er vragen over komen

[redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e i.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** zondag 3 januari 2021 15:42  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: vaccinatie na corona infectie

Ja het idee is wel minimaal 4 weken, met het idee dat herstel eventueel langer duurt. Dat staat er dus onduidelijk. Ik zal het in de tekst voor een volgende versie aanpassen.

Hartelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e  
 BIG-nummer: [redacted] 5.1.2e  
 Mobiel: 06 [redacted] 5.1.2e  
 E-mail: [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl  
 Werkdagen: [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** zondag 3 januari 2021 15:27  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e i.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** vaccinatie na corona infectie

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Bij het uitwerken van de Q en A kwamen [redacted] 5.1.2e en ik er niet goed uit wat het advies is mbt vaccinatie na een infectie.

In de NL richtlijn staat:

- Mensen die een positieve testuitslag voor COVID-19 hebben, zowel op basis van een neus- of keelwat (sneltest of PCR polymerase chain reaction ) als antistoffen in bloed, maar geen klachten, kunnen **vanaf 4 weken na de test** gevaccineerd worden (zie [UK COVID-19 vaccination programme](#)).
- Mensen die COVID-19 doorgemaakt hebben, kunnen veilig gevaccineerd worden met COVID-19-vaccin. De aanbeveling is daarom te wachten **tot herstel of om minimaal 4 weken na het begin van de symptomen** de vaccinatie toe te dienen.

Uit deze laatste bullet zou je kunnen concluderen dat je na herstel kunt vaccineren, ook als dat na 1 of 2 weken is na de EZD. In de UK richtlijn staat een minimum interval van 4 weken.

*Individuals with confirmed COVID-19 infection in the preceding 4 weeks should postpone vaccination until clinical recovery and at least four weeks after onset of symptoms or four weeks from the first positive specimen in those who are asymptomatic.*

In de Q en A hebben we nu aangehouden:

[redacted] 5.1.2e

Dus geen of, maar en. Mee eens?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T 030 5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Werkdagen 5.1.2e

---

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM )**

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 (interne postbak 1124) | 3720 BA Bilthoven

T ( 030 ) 274 7000

---