

**To:** [redacted] [redacted] @ggdru.nl]  
**From:** LCI Voorwacht  
**Sent:** Wed 1/6/2021 9:14:37 AM  
**Subject:** RE: Type II of type IIR bij groeps vaccinatie: richtlijnen spreken niet op een lijn.  
**Received:** Wed 1/6/2021 9:14:38 AM

Beste heer [redacted]

Dank voor uw oplettendheid.

Na overleg met de betrokken collega is ervoor gekozen de richtlijnen ongewijzigd te laten, met de volgende reden:

De 'Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021' gaat specifiek over het vaccineren van volwassenen in een hoog endemische situatie, waarbij het gebruik van een type IIR MNM wordt geadviseerd.  
 De 'Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis' paragraaf C.2 heeft betrekking op een meer algemene setting, bijvoorbeeld RVP vaccinaties bij kinderen (die een kleinere rol spelen in de epidemiologie van COVID-19), waarbij het gebruik van type II MNM als adequaat wordt beschouwd. Door deze aanpak blijft er ruimte om hogere eisen aan PBM te stellen indien daarvoor aanleiding is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
 en Milieu  
 Ministerie van Volksgezondheid,  
 Welzijn en Sport

[redacted]

RIVM - Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding  
 Postbus 1 - 3720 BA Bilthoven  
 www.rivm.nl

[redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@ggdru.nl>  
**Sent:** dinsdag 5 januari 2021 21:48  
**To:** LCI Voorwacht <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** Type II of type IIR bij groeps vaccinatie: richtlijnen spreken niet op een lijn.

Hallo,

Een vraag over mondneusmasker gebruik bij groeps vaccinaties:

In de uitvoeringsrichtlijn COVID-vaccinatie staat:

Gezien de huidige hoge prevalentie van COVID-19 in Nederland en de hoeveelheid contactmomenten van een medewerker met personen die gevaccineerd worden, adviseert het RIVM daarom tijdens de COVID-19-vaccinatie **chirurgische mondneusmaskers type IIR** voor medewerkers die betrokken zijn bij de vaccinatie

In de richtlijn PBM gebruik zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis staat:

Zorgmedewerkers kunnen preventief een mondneusmasker gebruiken bij patiënten ZONDER (verdenking op) COVID-19, om te voorkomen dat zij zelf besmet raken met COVID-19 of dat zij hun patiënten besmetten. Voor zorgmedewerkers geldt het advies om vanaf inschalingsniveau 'zorgelijk' een **chirurgisch mondneusmasker ten minste type II** te gebruiken in de volgende situaties:

- een zorgsituatie waarbij veel patiënten in een aaneengesloten periode op minder dan 1,5 meter worden beoordeeld/ behandeld, **bijvoorbeeld bij een groeps vaccinatie;**

Zouden jullie dit gelijk willen trekken: of type II of type IIR?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e Seksuele gezondheid  
GGD regio Utrecht  
M 5.1.2e

[GGD regio Utrecht e-mail disclaimer](#)

