To: 5.1.2e)'[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Sat 1/16/2021 3:31:22 PM
Subject: RE: Concept bericht 12 instellingen
Received: Sat 1/16/2021 3:31:48 PM

Beste allen,

@Het Europees onderzoek mag er zeker in. Ik houd vooral van korte teksten, dat was de reden.
@ De reactie van CBG gisteren: Deze meldingen uit Noorwegen zijn bij ons bekend. Alle meldingen van mogelijke bijwerkingen in heel Europa worden verzameld (in NL door Bijwerkingencentrum Lareb), onderzocht en besproken in het Europese geneesmiddelenbewakingcommitée PRAC. Er is voor deze groep op dit moment geen contra-indicatie. De PRAC gaat na of het overlijden door het vaccin veroorzaakt is. Mocht de PRAC besluiten dat hier aanleiding toe is dan wordt er mogelijk actie ondernomen, bijvoorbeeld in de vorm van waarschuwing of aanpassen van de productinformatie (bijsluiter, informatie voor zorgverleners). Naast deze ad hoc veiligheidsupdates worden de vaccins ook maandelijks geëvalueerd.
@ 13 hoeft ook niet perse

Extra: ECDC rapport:

On January 14, The Norwegian Medicines Agency has reported on 23 deaths that have occurred in older frail individuals following vaccination with COVID-19 mRNA vaccines. Of those deaths, 13 have so far been investigated with the results suggesting that common side effects may have contributed to severe reactions in frail, elderly people, according to the Norwegian Medicines Agency. Such individuals were not included in the phase 3 trials. The agency has adapted their vaccination guidelines for the frail elderly.

Noorwegen rapporteert 23 sterfgevallen onder fragiele ouderen na COVID-19 vaccinatie (mRNA vaccins).
Ze hebben dit onderzocht en geven aan dat veel voorkomende bijwerkingen van mRNA-vaccins, zoals koorts en misselijkheid, mogelijk hebben geleid tot sterfgevallen bij sommige kwetsbare patiënten.

In Noorwegen geldt daarom het volgende advies: (met dank aan google translate)

Vaccinatie van zeer kwetsbare en zieke patiënten
Voor de overgrote meerderheid van de ouderen die met kwetsbaarheid leven, worden eventuele bijwerkingen van het vaccin ruimschoots gecompenseerd door een verminderd risico om ernstig ziek te worden door covid-19. Voor degenen met de meest ernstige kwetsbaarheid kunnen zelfs relatief milde bijwerkingen van het vaccin ernstige gevolgen hebben. Voor degenen die een zeer korte resterende levensduur hebben, kan het voordeel van het vaccin marginaal of irrelevant zijn. Daarom wordt voor zeer kwetsbare patiënten (bijv. Equivalent aan klinische kwetsbaarheidsschaal 8 of hoger) en terminaal zieke patiënten een zorgvuldige afweging van voor- en nadelen van vaccinatie aanbevolen.



Volgende 3 pagina's verwijderd (= dubbel)