

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 1/21/2021 1:42:36 PM
Subject: RE: interval aanpassing - donderdag voorstel akkoord
Received: Thur 1/21/2021 1:42:36 PM

Ja, kan met voorstel naar [5.1.2e], zoals net besproken voor 1 vraag.

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: donderdag 21 januari 2021 14:30
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: interval aanpassing - donderdag voorstel akkoord

Hoi [5.1.2e]

Volgens mij hoeven de antwoorden op deze twee vragen niet gewijzigd te worden. Die 4 weken worden aangehouden omdat de meeste mensen dan weer beter zijn. Heeft niets te maken met de periode die er tussen de 2 prikken zit.

Maar.....de vraag *Hoe lang zit er tussen de eerste en tweede vaccinatie?*, staat niet op onze website, maar op die van de Rijksoverheid. En daar is het antwoord nog niet aangepast.

De enige vraag op onze website met verwijzing naar de 3 weken is deze:
Ik kon de tweede vaccinatie niet na 21 dagen halen omdat ik toen ziek was, moet ik dan opnieuw beginnen met de vaccinaties?

Voorstel:

[5.1.2e]

Wat vind je?

Groeten, [5.1.2e]

[5.1.2e]

RIVM Stafeenheid Communicatie/
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Tel. [5.1.2e]
Mobiel: [5.1.2e]
www.rivm.nl
www.infectieziektenbulletin.nl

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: donderdag 21 januari 2021 10:37
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: interval aanpassing - donderdag voorstel akkoord

Ha [5.1.2e] loopt dit al? In overleg vanmorgen kwam het punt van interval aan de orde. Groet, [5.1.2e]

From: [5.1.2e]

Sent: dinsdag 19 januari 2021 16:55

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: interval aanpassing - donderdag voorstel akkoord

Hoi 5.1.2e

Op 2 plekken in de Q&A's staat iets over de 2^{de} vaccinatie na 21 dagen/3 weken. Dat moet aangepast worden, op basis van info uit de mail hieronder. Svp niet verder delen nog.

Die heb ik even vertaald naar:

De periode tussen eerste en tweede vaccinatie met het Pfizer vaccin wordt aangepast van 3 naar 6 weken. Door de periode tussen de vaccinaties te verlengen kunnen meer mensen op korte termijn worden gevaccineerd. Dit gebeurt op advies van de Gezondheidsraad en het OMT en na besluit van de minister van VWS. Dit gebeurt ook al in andere landen in Europa. De periode van 6 weken is conform WHO advies en er zijn studies gedaan naar effectiviteit.

Kun jij op basis van de info een voorstel doen voor aanpassing van deze vragen? Misschien beter om helemaal geen specifieke periode te noemen. En morgenmiddag voorstel aan 5.1.2e sturen?

Ik probeer een soort van vrij te zijn morgen, maar werk ook nog wel, alleen niet hier aan. Donderdag kunnen we aanpassingen verwerken.

Groet,

5.1.2e

<https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden/werkzaamheid>

Ik kon de tweede vaccinatie niet na 21 dagen halen omdat ik toen ziek was, moet ik dan opnieuw beginnen met de vaccinaties?

Pfizer

Nee, dat hoeft niet. Het advies is om de tweede vaccinatie na 21 dagen te geven, maar als dat niet gelukt is, dan hoef

<https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden/ziekte-medicijnen-en-behandelingen>

Ik ben na de eerste vaccinatie positief getest op COVID-19. Moet ik de tweede vaccinatie dan nog halen?

Pfizer

Ja, we adviseren je om de serie af te maken. Je kunt de tweede vaccinatie halen 4 weken na de start van de klachten. positieve test.

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 19 januari 2021 10:58

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: interval aanpassing

- In paragraaf 5.2 is het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie Comirnaty aangepast. Op basis van het gezamenlijk advies van de Gezondheidsraad en het OMT heeft de minister van VWS besloten dit interval te verlengen. In de effectiviteitsstudie zijn deelnemers geïnccludeerd die een tweede dosis kregen tot 42 dagen na de eerste vaccinatie. Daarnaast is dit ook conform een recent WHO advies. In andere landen in Europa zoals Duitsland, Denemarken en Frankrijk wordt uitgegaan van een interval van maximaal 6 weken. Deze verlenging van het interval geeft de mogelijkheid om meer mensen op korte termijn te vaccineren. Vanaf nu worden nieuwe afspraken voor de tweede vaccinatie gepland in de 6e week na de eerste vaccinatie, 35 – 42 dagen na de eerste vaccinatie. Als dat niet lukt, dient de afspraak later gemaakt te worden. Reeds geplande afspraken voor de tweede vaccinatie worden niet verzet. Het interval tussen twee vaccinaties COVID-19 Vaccine Moderna blijft 28 dagen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
T 030 5.1.2e
M 06
5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)
Werkdagen 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 5.1.2e 3720 BA Bilthoven

T (030) 5.1.2e
