

Tegelijk constateerden zowel de instellingen als de inspectie een aantal aandachtspunten;

Aandachtspunten

- Het is belangrijk dat tijdens de distributie naar instellingen en vervolgens naar de diverse locaties en afdelingen steeds gevolgd wordt waar de vaccins zijn en onder welke omstandigheden ze opgeslagen of vervoerd worden. Dit vraagt nauwkeurigheid en aandacht.
- Veel cliënten verblijven in hun eigen appartement, andere in de huiskamers. Zorgaanbieders moeten daarom goed nadenken over de wijze waarop zij het observeren van deze cliënten de eerste 15 minuten na het vaccineren vormgeven.

Tips

- Een instelling informeerde via 'vraag en antwoord' aan het einde van de eerste vaccinatiedag een collega-instelling. Hiermee informeerde en ondersteunde men elkaar.
- Zowel de instellingen als de apothekers gaven aan dat zij hun opgedane ervaringen graag wilden inzetten bij collega instellingen die nog moeten starten met vaccineren.
- Vooral de kleinere instellingen kunnen veel leren van grote instellingen uit hun eigen regio die al met vaccineren zijn gestart. Deze grote instellingen hebben vaak kennis en apparatuur die zij willen delen.
- Maak een plan om het verspillen van eventueel overgebleven vaccin te voorkomen. Volg hiervoor de actuele werkinstructie van het RIVM: Hierin staat nu dat dit vaccin is voor: 1. Cliënten op locatie die in aanmerking zouden komen voor Moderna via de huisarts; 2. Ambulante cliënten boven de 60 op locatie; 3. Ambulante cliënten onder de 60 op locatie; 4. Eigen personeel eerst de prikkers, dan cohortmedewerkers, dan overigen. Als er niet voldoende vaccin is voor de tweede prik mag hiervoor een afspraak gemaakt worden bij de GGD.



5.1.2e

| COVID-19-vaccinatie | RIVM

T +31 (0)30

5.1.2e

| M +31 (0)6

5.1.2e

E

5.1.2e

| @rivm.nl |

Werkdagen:

5.1.2e