

Anafylactische shock - instructiekaart

<p>ABCDE Airway: vrij of niet? niet? Hoofd- kantel-kinliftmethode Breathing: stridor, diepte, gebruikt hulpademhalingsspieren Circulation: huidskleur, tensie, polsfrequentie (regelmatig, vulling) Disability: alert, reageert op aanspreken of pijn, reageert niet Exposure: huidreacties, slijmvliesreacties</p> <p>Bij verdenking ernstige calamiteiten bel 112!!</p>	<p>REANIMATIE <u>Reanimatie volwassenen:</u> Borstcompressie en beademing verhouding 30:2</p> <p><u>Reanimatie kinderen ≤ 15 jaar:</u> Borstcompressie en beademing Verhouding 15:2 MET 5 initiële beademingen</p>	<p>REANIMATIE: MEDICATIE Kinderen 15-30 kg: i.m. EpiPen Junior Kinderen en volwassenen > 30 kg: i.m. EpiPen</p> <p>OF</p> <p><u>Adrenaline: 1:1000 (1mg/ml)</u> Kinderen < 6 jaar: i.m. 0,15 mg Kinderen 6-12 jaar: i.m. 0,3 mg Volwassenen: i.m. 0,5 mg</p>
---	--	---

Clïent onwel kort na vaccinatie: differentiaal diagnose

<p>Paniek aanval:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snelle oppervlakkige ademhaling - koude extremiteiten - benauwd gevoel - angstig, paniek - ijl gevoel in hoofd - duizelig - eventueel hoofdpijn - misselijk, braakneiging - tintelingen vingers en rond de mond 	<p>Anafylactische reactie</p> <ul style="list-style-type: none"> - stridor - gegeneraliseerde urticaria - hypotensie - tachycardie - bronchospasme - angio-oedeem 	<p>Vasovagale reactie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pols <80/min - bleek en klam - koude extremiteiten
<p>Urticaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Snel opkomende, voorbijgaande, scherp begrensde erythemateuze zwellingen - Grootte varieert - Meestal (heftige) jeuk; soms zijn de zwellingen pijnlijk en branderig. 		
<p>Epileptisch insult</p> <ul style="list-style-type: none"> - aanhoudende schokkende bewegingen én geen reactie op aanspreken 		

Anafylactische reactie: BEL 112 + toedienen medicatie:	
1° keus: Clemastine (1mg/1ml) i.m.	
<u>Volwassenen:</u> Clemastine i.m. 2mg	<u>Kinderen t/m 12 jaar:</u> Clemastine i.m. 0,025mg/kg
2° keus: Adrenaline: 1:1000 (1mg/ml) i.m.	
<u>Volwassenen:</u> Adrenaline i.m. 0,5mg z.n.	<u>Kinderen ≤ 5 jaar:</u> i.m. 0,15 mg
EpiPen i.m. z.n.	<u>Kinderen 6-12 jaar:</u> i.m. 0,3 mg
<i>1x herhalen na 5-15min indien de klachten niet zijn afgenomen</i>	<u>Kinderen 15-30 kg:</u> i.m. EpiPen Junior
	<u>Kinderen > 30 kg:</u> i.m. EpiPen

Epileptisch insult Couperen als aanval > 5 min, status epilepticus:	
<u>Volwassenen:</u> Diazepam rectiole: 10mg/keer, bij onvoldoende werking 20mg/keer. Z.n. na 10 min herhalen	
<u>Kinderen > 3 jaar:</u> Diazepam rectiole: 10 mg/keer. Zo nodig na 10 min herhalen.	
<u>Kinderen 1-3 jaar:</u> Diazepam rectiole: 5 mg/keer. Zo nodig na 10 min herhalen	
<u>Kinderen < 1 jaar:</u> Diazepam rectiole: 0,5 mg/kg lichaamsgewicht/keer. Zo nodig na 10 min herhalen	

Vasovagale reactie
Wacht op herstel
Controleer vitale functies, bewustzijn en kenmerken van matige/ernstige reactie en handel naar gelang bevindingen

Bij uitsluitend urticaria:	
Overweeg antihistaminicum:	
1° keus - Oraal:	
<u>Volwassenen:</u> Levocetirizine 5mg	<u>Kinderen t/m 5 jaar:</u> Levocetirizine 2,5ml drank
2° keus - Intramusculair:	
<u>Volwassenen:</u> Clemastine i.m. 2mg	<u>Kinderen t/m 12 jaar:</u> Clemastine (1mg/1ml) i.m. 0,025mg/kg