

19

maart

2020

(Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (30)

Dit is een gecombineerd Inf@ct-/Labinf@ctbericht.

IN DIT BERICHT:

Situatie rapportage aantal patiënten

Osiris-meldingen COVID-19

Contactonderzoek en melding in HPZone

Testbeleid wordt aangescherpt voor zorgmedewerkers en patiënten buiten het ziekenhuis

Medicatie van Gilead Remdesivir niet meer via LCI

LCI-richtlijn, nieuwe informatie

In voorbereiding

BERICHT:

Toename aantal patiënten

Volgens de update van 18 maart 14:00 zijn er nu 2051 personen bekend met een bevestigde infectie, dat zijn 346 nieuwe patiënten ten opzichte van 17 maart. Er zijn in totaal 58 personen overleden. De mediane leeftijd van de overledenen is 84 jaar (jongste 63 - oudste 95). Mede omdat het testbeleid zich nu richt op het vroeg opsporen van patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beeld, dan wel een indicatie voor opname, is het aantal gemelde personen een onderschatting van het ware aantal besmette personen in Nederland. Het opname- en sterftepercentage wordt daarmee ook hoger dan in werkelijkheid het geval is, de (zeer) mild verlopende gevallen worden immers niet meegenomen in de noemer. Kijk voor de dagelijkse update op Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) | RIVM.

Osiris-meldingen COVID-19

Allen hartelijk dank voor uw inzet rondom het melden van overlijdens t.g.v. COVID-19. Nu de achterstanden in Osiris weggewerkt zijn, hopen we dat overlijdens snel in Osiris gemeld kunnen worden. Wanneer deze voor 10:00 uur 's ochtends ingevoerd zijn, kunnen ze meegenomen worden in de dagrapportage. Telefonisch of via e-mail doormelden wordt daarmee overbodig. Bij bijzondere casuïstiek/overlijdens wordt de LCI wel graag telefonisch op de hoogte gesteld.

Om de werklast te beperken, is i.o.m. de Osiris-registratiecommissie de vragenlijst in Osiris voor het melden van COVID-19 gevallen aanzienlijk ingekort. Er is één vraag toegevoegd ('datum IC opname'), voor personen die op de IC zijn opgenomen. Wanneer dit onbekend is, kan dit aangegeven worden als antwoord. De nieuwe versie komt z.s.m. online. Bij meldingen die aangemaakt zijn in de huidige (lange) vragenlijst, hoeven alleen de vragen beantwoord te worden uit de verkorte vragenlijst.

Meldingen worden door het RIVM pas meegeteld als op de vraag 'Wat is de laboratoriumuitslag?' is ingevuld 'Positief voor SARS-CoV-2'. Graag dus deze vraag met prioriteit invullen.

Contactonderzoek en melding in HPZone

Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en overige contacten van de patiënt. De informatiebrieven hiervoor zijn aangepast, zie de LCI-richtlijn COVID-19. Contacten hoeven niet meer geregistreerd te worden in HPZone.

Testbeleid aangescherpt

Aangezien de testcapaciteit in Nederland beperkt is, worden de indicaties voor testen momenteel aangescherpt en in een richtlijn uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt de continuïteit van zorg aan patiënten en kwetsbare personen door gezonde zorgmedewerkers gewaarborgd blijft.

Testbeleid zorgmedewerkers

Een uniform testbeleid voor zorgmedewerkers (intra- en extramuraal) is momenteel in de maak en wordt landelijk afgestemd. Dit is nodig, omdat er grote verschillen bestaan tussen regio's en ziekenhuizen onderling. Ook voor extramurale zorgmedewerkers wordt een verschillend testbeleid gehanteerd. Tot nader bericht wordt verzocht het testen met terughoudendheid toe te passen bij zorgmedewerkers die niet betrokken zijn bij de directe zorg van kwetsbare patiënten. Zie voor meer informatie de informatie voor professionals op de RIVM-website.

Testbeleid voor patiënten buiten het ziekenhuis

Huisartsen

Dit beleid is samen met de NHG tot stand gekomen en zal ook op hun website worden geplaatst.

Het testen van patiënten op COVID-19 heeft geen meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg in de thuissituatie. Het verandert het behandelbeleid niet. Zorgverleners dienen bij een patiënt verdacht voor COVID-19 persoonlijke beschermingsmaatregelen te gebruiken. Mocht een patiënt met dergelijk ziektebeeld ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis zal testen in het ziekenhuis worden gedaan. Indien huisarts in de thuissituatie, in uitzonderlijke gevallen, toch diagnostiek wil inzetten naar COVID-19, dan dient hij/zij dit zelf regelen, zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en/of GGD.

Instellingen

Het testen van patiënten in instellingen is gericht om introductie van COVID-19 binnen een instelling vast te stellen. Na 1-2 bewezen COVID-19-patiënten wordt niet verder getest maar gehandeld vanuit het uitgangspunt dat er een corona-uitbraak binnen de instelling gaande is. Voor de te nemen maatregelen na vaststelling van COVID-19 in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of voorziening voor kleinschalig wonen, zie de richtlijn van Verenso. Dit testbeleid blijft voorlopig ongewijzigd gelden.

Medicatie van Gilead Remdesivir niet meer via LCI

Artsen kunnen nu rechtstreeks naar online portal van Gilead om over de indicaties en levering van Remdesivir te overleggen. Adres ervan staat in de bijlage over medicamenteuze behandelopties. DVP en Gilead sluiten daarna kort over goedgekeurde indicaties en leveringen. Er hoeft niet meer met de LCI over de indicatie overlegd te worden. We vragen u dit door te geven aan de betrokken behandelaren.

Richtlijn

Als bijlage beschikbaar: Preventie adviezen voor personen met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19.

De informatie voor patiënten die positief getest zijn voor COVID-19 in thuisisolatie en voor personen die thuis moeten blijven i.v.m. verkoudheidsklachten of koorts en/of hoesten is aangepast. Idem voor gezinsgenoten en andere contacten van deze personen.

In voorbereiding

Uniform testbeleid voor zorgmedewerkers

Richtlijnen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Richtlijn over (her)sterilisatie en later hergebruik van mondmaskers

Contactgegevens

Overleg met uw regionale GGD over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.

RIVM-LCI: tel. 5.1.2e (ook buiten kantooruren bereikbaar)

RIVM dd. viroloog: tel. 5.1.2e (ook buiten kantooruren bereikbaar)

Erasmus MC, dd. viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience: tel. 5.1.2e (buiten kantooruren: 5.1.2e)

Meer informatie

ECDC

WHO en Dagelijkse WHO situation reports

RIVM (algemene informatie)

LCI-richtlijn COVID-19

Rijksoverheid

Auteurs: 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (GGD Hart voor Brabant/RAC), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Erasmus MC), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (GGD Gelderland Midden/RAC), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM)