

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl;
(10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 8/10/2020 7:53:00 AM
Subject: Antw: Testen en Riool bemonstering Covid-19 VR Groingen
Received: Mon 8/10/2020 7:53:00 AM

Ha allen

Helaas is de SARS-CoV-2 uitscheiding in urine nog beperkter dan in feces. Het virus is een enkele keer aangetoond in de urine van enkele mensen met het nieuwe coronavirus (Ling et al 2020), terwijl in sommige andere studies SARS-CoV-2 niet in urine kon worden aangetoond (Wang et al 2020; Holshue et al 2020). In een review van Chan zie COVID-19 literatuur folder gemiddeld 6% Pos in urine over 21 studies.


Groeten


(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)







Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)





(10)(2e)

Dubbel