

**To:** (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]  
**Cc:** (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]  
**From:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Fri 8/28/2020 12:18:20 PM  
**Subject:** OMT advies n.a.v. ozk (10)(2e)  
**Received:** Fri 8/28/2020 12:18:21 PM  
[Advies 76e OMT COVID-19.pdf](#)  
[Bijlage 1 COVID-19 VPH-studie verpleeghuis.pdf](#)

Beste (10)(2e) en (10)(2e)

Ook voor jullie nog het advies van het OMT, die het advies van (10)(2e) & (10)(2e) heeft overgenomen. Belangrijkste conclusie is dat tot preventief gebruik beschermingsmiddelen in verpleegtehuizen moet worden overgegaan als de omgevingsprevalentie toeneemt door medewerkers, extra maatregelen voor bezoekers en quarantaine bij zorgtransities.

Interessant is dat preventief gebruik door medewerkers wordt geadviseerd, maar niet zo stellig wordt gezegd dat dat ook geldt voor bezoekers. Voor bezoekers dus alleen extra maatregelen (wat natuurlijk nog steeds ook preventief gebruik van mondklappers kan betekenen).

Dit schept uiteraard wel een voorbeeld voor andere sectoren.

Groet, (10)(2e)