

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minwv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minwv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 4/22/2020 12:12:49 PM
Subject: cohort
Received: Wed 4/22/2020 12:12:49 PM

Hierbij het antwoord dat ik in overleg met Verenso had gemaakt op een van de kamervragen van Bergkamp, die nog niet zijn verzonden. Hier kunnen we het OMT-advies nog aan toevoegen.

Groet, (10)(2e)

14. Klopt het dat de richtlijn ten aanzien van een besmetting in een verpleeghuis voorschrijft dat een hele groep bewoners samen geïsoleerd wordt, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de hele groep reeds besmet is? Zo ja, lopen cliënten binnen een geïsoleerde groep die nog niet besmet zijn, dan geen onnodig risico op besmetting door deze vorm van groepsisolatie? Zijn hiervoor geen andere oplossingen mogelijk? Op welke wijze wordt deze aanpak meegenomen in de registratie van de sterftecijfers?

In het COVID-19 (behandel)advies van Verenso en de NVAVG van 16-4 is aangegeven dat bij cohortering een duidelijke scheiding plaatsvindt van zieken en niet zieken. Zoals (10)(2e) in de technische briefing van 16 april heeft aangegeven kan een uitzondering gemaakt worden in het geval van een woongroep waar mensen veel onderlinge contacten hebben en de situatie vergelijkbaar is met die in een gezin. Dan kan het voorkomen dat de groep als geheel wordt geïsoleerd als men ervan uit kan gaan dat bij besmetting van een aantal van de bewoners ook de andere groepsleden besmet zullen zijn.