

To: 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e
Sent: Tue 11/24/2020 12:30:33 PM
Subject: RE: Vertrouweljk: Stukken voor de commissie vaccinaties van de GR 26 november 2020
Received: Tue 11/24/2020 12:30:34 PM

Hoi 5.1.2e

Dank je, helder.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
Werkdagen: 5.1.2e
Kamer: 5.1.2e

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 5.1.2e
3720 BA Bilthoven

Telefoon 5.1.2e
Telefoon mobiel 5.1.2e
rijksvaccinatieprogramma.nl
rvp.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 24 november 2020 12:18

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Vertrouweljk: Stukken voor de commissie vaccinaties van de GR 26 november 2020

Hi 5.1.2e

- Mijn argumenten voor vaccinatie van zwangeren heb ik in get document gezet.
1. Bescherming zuigelingen 0-6 maanden (zelfs ook tegen complicaties van influenza als bv AOM)
 2. Bescherming van zwangere zelf
 3. Ook bij beperktere effectiviteit van het vaccin, toch reductie van grote seizoens ziekte last
 4. Wat betreft trimesters: vanaf 12 weken was goed voor kinkhoest, weinig reden vooralsnog om aan te nemen dat dit anders is voor influenza subunit vaccin?

Dus bv vanaf 12 weken zwangerschap in oktober/november? Of vanaf 16 weken?

5.1.2e

