



KOEPEL 2

- 730 bewoners
- 7 locaties, 74 Afdeling
- Verpleeghuis, woonzorg, hospice, gemengde afdelingen (huur, wz, vph...)


Noord-Brabant		
AR bewezen gevallen GGD t.e.m 31-5	0,35%	352/100.000
Seroprevalentie Sanquin 20-5	8-10%	
Nederland		
Mortaliteit t.e.m. 20-6	0,35 per 1000	
CFR t.e.m. 5-6	12,7%	

	Bewoners	Cases	AR	Overleden**	Mortaliteit per 1000	CFR	Af totaal	Af + Intro (n)	(%)	Af + > Intro* (%)	Af Intro + trans	(%)	Intro	Intro+ trans	Mediaan clus	Mediaan duur (d)	
Verpleeghuis	281	37	13,2%	15	53,38	40,5%	41	12	29%	0	0%	11	27%	12	9	3	10
Somatisch	128	9	7,0%	6	46,88	66,7%	18	3	17%	0	0%	2	11%	2	8	2.5	11.5
PG	153	28	18,3%	9	58,82	32,1%	23	10	43%	0	0%	8	35%	10	1	3	4
Gemengde afdelingen*	441	23	5,2%	4	9,07	17,4%	32	5	16%	0	0%	3	9%	6	4	3.5	9
Hospice	8	0	0,0%	0	0,00	0,0%	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0
TOTAAL	730	60	8,2%	19	26,03	31,7%	74	18	24%	0	0%	13	18%	18	13	3	10



KOEPEL 3

- 1700 bewoners
- 22 locaties
- Verpleeghuis (n = 1100), Woonzorg (n= 600)




KOEPEL 4

- 100 bewoners
- 4 locaties, 5 afdelingen
- Revalidatie

CFR
8,3%

Noord-Brabant		
AR bewezen gevallen GGD t.e.m 31-5	0,35%	352/100.000
Seroprevalentie Sanquin 20-5	8-10%	
Nederland		
Mortaliteit t.e.m. 20-6	0,35 per 1000	
CFR t.e.m. 5-6	12,7%	

	Bewoners	Cases	AR	Overleden**	Mortaliteit p	Af totaal	Af + Intro (n)	(%)	Af + > Intro**	(%)	Af Intro + tra	(%)	Intro	Intro+ trans	Mediane goc	Mediane duu
Revalidatie	100	24	24,0%	2	20,00	5	4	80%	0	0%	3	60%	4	3	10	1.1



●	EZD client indien bekend
●	Afname datum positieve PCR client indien EZD onbekend
●	EZD client
●	Afname positieve PCR client
→	Tijd tussen EZD en positieve test cliënt (indien > 1 dag)
→	Tijd tussen EZD en positieve test medewerker (indien > 1 dag)

CONCLUSIE

- Cijfers t.o.v. populatie minder dramatisch, dit hoeft niet de regel te zijn
- Hoge CFR, voornamelijk bij PG patiënten
- Niet alle introducties worden gevolgd door transmissie, controle is haalbaar
- BELANG VAN DIAGNOSTIEK
 - Bewoners
 - Medewerkers
- Medewerkers mogelijke bron introductie na sluiting → voor laagdrempelig testen en inventariseren (verspreiding gemeenschappelijke werkplekken)
- Verpleeghuizen en voornamelijk PG (vermoedelijk) kwetsbaarst, goed gecontroleerde omgeving – snel ingrijpen, Quid cohortverpleging vs snel naar externen verplaatsen