

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	<i>Ziekenhuismedewerkers met klachten:</i> • <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>PBM gebruik</i> • <i>Testen**</i>	• Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Buiten het ziekenhuis:			
Huisartsenzorg	Patiënten uit de risicogroep* Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg) i.v.m. PBM	<i>Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten:</i> • <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>PBM gebruik</i> • <i>Testen**</i>	• Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
GGD'en	Patiënten uit de risicogroep* Indien nodig voor bestrijdingsmaatregelen	<i>Medewerkers met klachten</i> • <i>Thuisblijven</i>	• Bestrijdingsmaatregelen zoals contactonderzoek in regio's waar wijdverspreide transmissie nog niet is vastgesteld • Ter ondersteuning van huisartsen en extramurale instellingen
Thuiszorg	-	<i>Thuiszorgmedewerkers met klachten:</i>	• Bescherming risicogroepen

	Indicatie stelling door huisarts (zie boven)	• <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>Afstand houden</i> • <i>PBM gebruik</i> • <i>Testen**</i>	tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (allemaal lichamelijk kwetsbare patiënten)	Patiënten met klachten conform richtlijn VERENSO	<i>Verpleeghuis-medewerker:</i> • <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>PBM gebruik</i> • <i>Testen**</i>	• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebel eid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie en medewerkers • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Instellingen voor Jeugdzorg	Op indicatie bij gedragsproblemen	<i>Groeps werkers:</i> • <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>Afstand houden</i>	• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
LET OP DIT IS GEEN RISICOGROEP Mogelijk wel gedragsproblemen Instellingen voor gehandicapte zorg	Patiënten uit de risicogroep*	<i>Medewerkers gehandicaptenzorg:</i> • <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>Afstand houden</i> • <i>PBM gebruik</i> • <i>Testen**</i>	• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebel eid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten en medewerkers • Individuele

			- patiëntenzorg - Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Instellingen voor GGZ LET OP patiënten zijn over het algemeen niet lichamelijk kwetsbaar	Patiënten uit de risicogroep*	<i>mogelijkheden tot:</i> • <i>Thuisblijven</i> • <i>Vervangend werk</i> • <i>Afstand houden</i> • <i>PBM gebruik</i> • <i>Testen**</i>	• Vaststellen van uitbraak op afdeling/locatie voor infectiepreventiebelid (cohortering of isolatie) • Isolatie en bescherming verpleeghuispopulatie en medewerkers • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker • Surveillance
NIVEL-huisartsenpeil stations	Alle patiënten met griepachtige klachten	<i>n.v.t.</i>	

* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

** indien voldoende testcapaciteit, dan is testen optie 1!

Buiten het ziekenhuis

Buiten het ziekenhuis heeft het testen van patiënten met klachten en symptomen passend bij COVID-19 meerwaarde voor de individuele patiëntenzorg bij de risicogroepen zoals beschreven in de bijlage 'testbeleid risicogroepen'. Deze risicogroepen dienen getest te worden op COVID-19 vanwege:

1. Individuele zorg: mogelijk een snel en ernstig beloop van de infectie.
2. Snelle en adequate bestrijdingsmaatregelen in de directe omgeving en in de zorg
3. Mogelijke lange uitscheidingstijd van SARS-CoV-2 met het oog op het ontvangen van toekomstige zorg
4. Individuele zorg: het uitsluiten van COVID-19 ten behoeve van de differentiaal diagnose

Indien een huisarts in de thuissituatie, diagnostiek wil inzetten naar COVID-19, dan dient hij/zij dit zelf te regelen; zo nodig in overleg met het lokale laboratorium en/of de GGD.

In instellingen zoals verpleeghuizen, woonzorgcentra en andere plekken waar veel kwetsbare mensen bij elkaar wonen, wordt diagnostiek tevens ingezet om introductie vast te stellen. Dit is van belang voor het verpleegbeleid in de instelling.

In het ziekenhuis

Diagnostiek bij patiënten vindt plaats op geleide van het beleid in het betreffende ziekenhuis.

Zorgmedewerkers

Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij zorgmedewerkers, de [bijlage](#) [Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#).

Deze algemene uitgangspunten worden voor de verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers.

Voor de volgende sectoren zijn de adviezen nader uitgewerkt:

- [Inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktijk](#)

Zodra meer sectorspecifieke adviezen gereed zijn, zullen wij op deze pagina doorverwijzen naar deze producten.