

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 7/1/2020 12:52:33 PM
Subject: RE: testen asymptomaten bij BCO
Received: Wed 7/1/2020 12:52:34 PM

Nou... iets verder al hoor
uit zijn mail....

Na de aankondiging door RIVM dat er samen met de GGD'en een onderzoek gestart wordt naar de effectiviteit van het testen van
huisgenoten en nauwe contacten op twee momenten tijdens hun quarantaineperiode heb ik hier verder niets meer over gezien.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
Arts M&G (10)(2e) regionale consulenten
tel.: (10)(2e)
e-mail: (10)(2e) @rivm.nl
www.rivm.nl/infectieziekten


Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 14:45
Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: testen asymptomaten bij BCO

Hi (10)(2e)

De vraag van (10)(2e) ging over het bekorten van de quarantaineduur.

In de bijlage gaat men uit van testen van asymptotische contacten in het kader van bco, maar die indicatie is er
alleen bij een grootschalige uitbraak.
De berekeningen kloppen dus niet.

Groet (10)(2e)



volgende pagina(s) verwijderd i.v.m. volledig gelakte inhoud