

**Inschatting van de mate van immuniteit na een doorgemaakte COVID19 met volledige g
Situatie bij nieuwe blootstelling aan SARS-CoV-2 na 0,5-2 jaar**

PCR / klinisch beeld	Antistofvorming	Herinfectie met identiek virus mogelijk, kan even ziek/zieker worden vergeleken met 1e keer	Herinfectie met identiek virus mogelijk, wordt wrsch milder ziek/niet ziek vergeleken met 1e keer
Zwak positieve PCR in de keel zonder ontwikkeling van antistoffen	nee	X	
asymptomatische SARS-CoV-2 infectie	nee	X	
asymptomatische SARS-CoV-2 infectie	Neutraliserende antistoffen niet aantoonbaar na 4 wk		X
Milde symptomatische SARS-CoV-2	nee	X	
Milde symptomatische SARS-CoV-2	Neutraliserende antistoffen niet aantoonbaar na 4 wk		X
Ernstige symptomatische SARS-CoV-2	Neutraliserende antistoffen niet aantoonbaar na 4 wk		X
Ernstige symptomatische SARS-CoV-2	Neutraliserende antistoffen aantoonbaar na 4 wk		X

enezing

Herinfectie met identiek virus niet mogelijk	Herinfectie met identiek virus mogelijk, kan even besmettelijk/besmettelijker zijn vergeleken met 1e keer	Herinfectie met identiek virus mogelijk, is wrsch minder besmettelijk vergeleken met 1e keer
	X	
	X	
		X
	X	
		X
		X
		X