

Q&A's

Wat betekent het dat het OMT nu zegt dat mensen twee dagen voordat ze symptomen krijgen ook besmettelijk zijn?

Antwoord

Het OMT definieert de besmettelijke periode als 2 dagen voor het ontstaan van klachten tot 24 uur nadat men klachtenvrij is.

Dit betekent voor het testbeleid: we roepen de doelgroepen met klachten op zich meteen te laten testen, en niet 24 uur te wachten. Voor het aantal mensen dat getest moet worden maakt dit geen verschil.

Uit meer onderzoek blijkt nu dat rond de eerste ziektedag de hoeveelheid virus het best te meten blijkt te zijn.

Voortschrijdend inzicht.

En we moeten er nu –zeker nu we andere maatregelen loslaten- r zo snel mogelijk bij zijn met het BCO

Welke gevolgen heeft het gehad dat u geen rekening hield met presymptomatische overdracht?

We hebben wel degelijk rekening gehouden met pre-symptomatische overdracht (elke keer met de kennis van dat moment).

De belangrijkste maatregelen die we hebben genomen

- blijf zoveel mogelijk thuis
- Houdt 1,5 meter afstand
- Was heel vaak je handen

Daarmee hielden we rekening met presymptomatische overdracht. Anders was het voldoende geweest om te zeggen: blijf thuis als je ziek bent, houd afstand als je ziek bent en was je handen als je ziek bent.

Maar waarom moesten zorgmedewerkers dan eerst 24 uur wachten alvorens ze getest konden worden?

Zorgmedewerkers met klachten werden geacht thuis te blijven of, als hun klachten dit toelieten, door te werken met PBM. Hierdoor is het risico overdracht van het virus beperkt gebleven.

Waarom meldt u nu pas dat presymptomatisch bestaat?

In de technische briefing van 25 maart is dit al genoemd.

Bron en contactopsporing achtergrond

Voor 12 maart

bron en contactopsporing vooral gericht op het voorkomen van insleep (testen van mensen die in 'besmet gebied' zijn geweest en opsporen van infectieketens).

Labinf@ct 31 januari

Aan de LCI-richtlijn 2019-nCoV wordt een bijlage Contactonderzoek toegevoegd. Bij een bevestigde patiënt brengt de GGD de contacten in kaart. Bij contacten met symptomen passend bij een 2019-nCoV-infectie moet diagnostiek worden ingezet. Zij worden verder behandeld als een patiënt met verdenking op 2019-nCoV-infectie. Overige contacten worden gedurende 14 dagen gemonitord. Hoog-risicocontacten, zoals gezinsleden van patiënten, dienen 1 keer per dag hun temperatuur op te nemen en door te geven aan de GGD. Laag-risicocontacten melden het alleen als zij een temperatuur > 38 graden Celsius hebben gemeten. Symptoomloze contacten hoeven niet in quarantaine te verblijven, diagnostiek wordt alleen ingezet als contacten klachten ontwikkelen.

Labinf@ct 1 maart

Personen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die tot de hoogrisicocontacten behoren, moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze personen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen. Deze personen mogen wel naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten op afstand van anderen blijven en lichamelijk contact voorkomen. De informatiebrief voor hoogrisicocontacten is aangepast. (Zie de LCI-richtlijn COVID-19 voor zowel een Word- als PDF-versie van de informatiebrief)

Labinf@ct 6 maart

Social distancing advies voor inwoners Noord-Brabant

Om mogelijke verdere verspreiding tegen te gaan wordt de bevolking in provincie Noord-Brabant opgeroepen om bij klachten van luchtweginfectie en/of koorts de sociale contacten te beperken totdat de klachten over zijn. Een gezinscontact met klachten moet thuis blijven tot 14 dagen na het laatste onbeschermd contact met de patiënt EN het gezinscontact moet zelf ten minste 1 dag geheel klachtenvrij zijn maar hoeven niet meer getest te worden.

(10)(2g)

