

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Cc: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e) 0(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Sent: Wed 5/6/2020 6:17:57 AM
Subject: RE: URGENT nw selectie speekselmonsters PCR
Received: Wed 5/6/2020 6:17:58 AM

We nemen 2 sponsjes na elkaar af en dan gaat alles uit spons 1 in ep 1 en alles uit spons 2 in ep 2. We zien veel verschil per deelnemer (en dat was bij Vital met 4 sponsen nog duidelijker) in alle variaties: veel in spons 1 en niets in 2, andersom en alles gelijk volume.

We willen de samples ook voor andere testen gebruiken en dan is het van belang te weten hoe vaak een sample ontdooid is. We zullen samples uit de zelfde serie halen als de ronde hiervoor.

@ (10)(2e) @ (10)(2e) antwoorden jullie de selectie vraag?

Groeten (10)(2e) !

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 0(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 0(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 0(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)